

Aspirina Bayer® Safety Coated 81 mg (regime).

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

Fatti di droga	
Principio attivo (in ognicompressa)	Scopo
Aspirina 81 mg (FANS)*.....Antidolorifico *farmaco antinfiammatorionon steroideo	
Usi • per il sollievo temporaneo di dolori minori o come raccomandato da il tuo dottore. A causa della sua azione ritardata, questo prodotto non fornirà rapido sollievo dal mal di testa o altri sintomi che necessitano di un sollievo immediato. • chiedi al tuo medico informazioni su altri usi di Bayer Safety Coated 81 mg Aspirin	
Avvertenze Sindrome di Reye: i bambini e gli adolescenti che hanno o si stanno riprendendo dalla varicella o da sintomi simil-influenzali non devono utilizzare questo prodotto. Durante l'utilizzo di questo prodotto, se si verificano cambiamenti nel comportamento con nausea e vomito, consultare un medico perché questi sintomi potrebbero essere un segno precoce della sindrome di Reye, una malattia rara e grave. Avviso di allergia: l'aspirina può causare una grave reazione allergica che può includere: • orticaria • gonfiore del viso • asma (respirosibilante) • shock Avviso di sanguinamento dello stomaco: questo prodotto contiene un FANS, che può causare grave sanguinamento dello stomaco. La possibilità è più alta se tu • hanno 60 anni o più • ha avuto ulcere allo stomaco problemi di sanguinamento • assumere un anticoagulante o un farmaco steroideo • assumere altri farmaci contenenti FANS soggetta prescrizione o senza prescrizione (aspirina, ibuprofene, naprossene o altri) • bere 3 o più bevande alcoliche ogni giorno durante l'utilizzo di questo prodotto • impiegare più o più tempo di quanto indicato	
Non utilizzare in caso di allergia all'aspirina o a qualsiasi altro antidolorifico/riduttore della febbre	
Chiedi al medico prima dell'uso se • l'avvertenza relativa al sanguinamento dello stomaco si applica al tuo caso • ha avuto in passato problemi di stomaco, come bruciore di stomaco • soffre di ipertensione alta, malattie cardiache, cirrosi epatiche o malattie renali • stai prendendo un diuretico • hai l'asma	
Chiedi a un medico o al farmacista prima dell'uso se stai assumendo un farmaco su prescrizione per gotta • diabete • artrite	
Interrompi l'uso e chiedi a un medico se • si verifica una reazione allergica. Cerca subito assistenza medica. • manifesta uno dei seguenti segni di sanguinamento dello stomaco: • sentirsi svenire • vomitare sangue • avere feci nere o sanguinolente • avere mal di stomaco che non migliora • il dolore peggiora o dura più di 10 giorni • è presente arrossamento o gonfiore • si verificano nuovi sintomi • si verificano ronzii nelle orecchie o perdita dell'udito	
In caso di gravidanza o allattamento, chiedere a un operatore sanitario prima dell'uso. È particolarmente importante non usare l'aspirina durante gli ultimi 3 mesi di gravidanza se non espressamente indicato da un medico perché potrebbe causare problemi al feto complicazioni durante il parto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di sovradosaggio, richiedere assistenza medica o contattare immediatamente un centro antiveleni.	
Indicazioni • bere un bicchiere pieno d'acqua con ciascuna dose • adulti e bambini dai 12 anni in su: assumere da 4 a 8 compresse ogni 4 ore senza superare le 48 compresse in 24 ore se non indicato da un medico • bambini sotto i 12 anni: consultare un medico	

Aspirina Bayer® Safety Coated 81 mg (regime).

Altre informazioni •

conservare la scatola per indicazioni complete
avvertenze • conservare a temperatura ambiente

Ingredienti inattivi ossido di ferro nero, ossido di ferro marrone, cera carnauba, amido di mais, lacca di alluminio giallo n. 10 D&C, lacca di alluminio giallo n. 6 FD&C, ipromellosa, copolimeri dell'acido metacrilico di tipo C, polisorbato 80, cellulosa in polvere, glicole propilenico, gomma lacca, sodio lauril solfato, triacetina, trietilrato

Domande o commenti? 1-800-331-4536 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 EST) o www.bayeraspirin.com