

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale - per l'uso interno della Farmacia)

Opuscolo informativo per il paziente

Foglio illustrativo:

Informazioni per l'utente

Brolene® 0,1% p/v Collirio Propamidina isetonato

STADA



Questo volantino è
difficile da vedere leggere?
Telefono 01484 848164 per
aiuto

Legga attentamente questo foglio perché contiene informazioni importanti per lei.

Questo medicinale è disponibile senza

prescrizione medica. Tuttavia, è comunque necessario utilizzare Brolene Eye Drops con attenzione per ottenere i migliori risultati.

- Conservi questo foglio. Potrebbe essere necessario leggerlo Ancora.

- Chiedi al tuo farmacista se hai bisogno di più informazioni o consigli

- È necessario contattare un medico se il tuo i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 2 giorni - Se

uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Contenuto di

questo foglio: 1. Che cos'è Brolene collirio e a che

cosa serve 2. Prima di usare Brolene

collirio 3. Come usare Brolene collirio 4. Possibili

effetti indesiderati 5. Come

conservare Brolene collirio 6. Altre informazioni

1. Che cosa sono Brolene Collirio e cosa servono



Brolene collirio contiene un medicinale chiamato propamidina isetonato. Questo appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati disinfettanti e antifungini. Funziona bloccando la crescita dei batteri, consentendo al corpo di combattere l'infezione.

È usato per infezioni minori dell'occhio o della palpebra. I segni includono occhi irritati, rossi o infiammati, appiccicosità o una crosta sulla palpebra.

2. Prima di usare Brolene Collirio



Non usi questo medicinale e informi il

medico o il farmacista se è allergico (ipersensibile) alla propamidina isetonato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Brolene Collirio (elencati nel Paragrafo 6 di seguito).

I segni di una reazione allergica includono: eruzione cutanea, problemi di deglutizione o respirazione, gonfiore delle labbra, del viso, della gola, della lingua intorno agli occhi.

Non usi questo medicinale se quanto sopra riguarda.

Se non è sicuro, rivolga al medico o al farmacista prima di usare Brolene Eye Drops.



Faccia particolare attenzione con Brolene Collirio

se: Porta lenti a contatto. Non dovresti indossare lenti a contatto mentre usi queste gocce.

Se non è sicuro, quanto sopra riportato ti riguarda, si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Brolene collirio.

Gravidanza e allattamento Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale se è incinta, potrebbe rimanere incinta o se pensi di essere incinta.

Se sta allattando o sta pianificando di allattare, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere o usare qualsiasi medicinale.



Guida di veicoli e utilizzo di

macchinari Subito dopo l'uso di questo medicinale potrebbe avere la vista offuscata. Se ciò accade, non guidare né utilizzare strumenti o macchinari finché non si riesce a vedere chi

Informazioni importanti su alcuni eccipienti

Brolene Collirio Brolene Collirio contiene

benzalclonio cloruro. Questo medicinale contiene 0,0025

mg di benzalclonio cloruro in ciascuna goccia (0,05 ml) che equivale a 0,05 mg/ml.

Il benzalclonio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può alterare il colore delle lenti a contatto. È necessario rimuovere le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e rimetterle 15 minuti dopo.

Il benzalclonio cloruro può anche causare irritazione agli occhi, soprattutto se soffre di secchezza oculare o disturbi della cornea (lo strato trasparente nella parte anteriore dell'occhio). Se avverte una sensazione anomala agli occhi, bruciore o dolore agli occhi dopo aver usato questo medicinale, si rivolga al medico.

3. Come usare il collirio Brolene

Usi sempre Brolene collirio seguendo esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Dovresti consultare il tuo medico o il farmacista se sei sicuro.

Turn Over



Come usare questo medicinale

- Lavati le mani
- Togliere il tappo dall'ampolla
- Inclina la testa all'indietro
- Spremere una o due gocce all'interno della palpebra inferiore senza toccare l'occhio
- Chiudi l'occhio
- Rimuovere eventuali liquidi in eccesso dagli occhi con un fazzoletto pulito
- Rimetti sempre il tappo sul flacone non appena lo hai utilizzato



Quanto usarne

- Una o due gocce nell'occhio interessato fino a quattro volte al giorno
- Utilizzare per almeno 2 giorni
- Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 2 giorni, si rivolga al medico o al farmacista

Se si dimentica di usare Brolene Collirio

Se dimentichi una dose, usa la dose il prima possibile come ricordi. Tuttavia, se è quasi ora della dose successiva, salti quella dimenticata dose. Non utilizzare una dose doppia per il trucco per una dose dimenticata.

Se interrompe il trattamento con Brolene Collirio

Non smettere di usare Brolene Eye Drops perché i tuoi occhi si sentono meglio. Se ti fermi, l'infezione potrebbe ripresentarsi.



Se hai ulteriori domande sull'uso di questo prodotto, chiedi al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti collaterali

Come tutti i medicinali, Brolene Eye Drops può causare effetti collaterali sebbene non tutti li ottiene.

Smetti di usare Brolene Eye Drops e vedila medico il prima possibile:

- Hai qualsiasi tipo di problema alla pelle, come un'eruzione cutanea o prurito intorno agli occhi o loro diventare più rossi
- Provi una sensazione di pizzicore o bruciore al tuo occhio

Segnalazione degli effetti collaterali

Se riscontri effetti collaterali, parlane con il tuo medico, farmacista o infermiere. Ciò comprende eventuali effetti collaterali non elencati in questo volantino. Puoi anche segnalare gli effetti collaterali direttamente tramite il programma YellowCard Scheme all'indirizzo: www.mhra.gov.uk/whitecard o cerca Cartellino giallo MHRA in Google Play o App Store di Apple. Segnalando gli effetti collaterali puoi aiutare fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questa medicina.

5. Come conservare Brolene Collirio

Conservare questo medicinale in un luogo sicuro dove i bambini non possono vederlo o raggiungerlo.

Non utilizzare Brolene Collirio dopo il data di scadenza riportata sull'etichetta e cartone. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C

Le gocce oculari Brolene sono sterili al momento dell'acquisto loro, quindi non devi tenerli più a lungo di quattro settimane dopo l'apertura del flacone (o se le gocce vengono utilizzate in un ospedale ambiente, dovrebbero essere utilizzati solo per 7 giorni dopo la prima apertura).

I medicinali non devono essere smaltiti tramite acque reflue o rifiuti domestici. Chiedi al tuo farmacista come smaltire i medicinali più richiesti. Queste misure aiuteranno a proteggere l'ambiente.

6. Ulteriori informazioni

Cosa contiene Brolene collirio

- La soluzione contiene lo 0,1% (p/v) del principio attivo, propamidina isetonato. Gli altri componenti sono
- ammonio cloruro, sodio cloruro, benzalconio cloruro, sodio idrossido e acqua per preparazioni iniettabili.

Come si presenta Brolene Collirio e contenuto della confezione

Brolene Eye Drops è un liquido fornito in un flacone contagocce in plastica da 10 ml con tappo antimanomissione. Potrebbe esserle fornito anche un dispositivo di rilascio automatico fornito come articolo separato

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e Produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

STADA, Linthwaite, Huddersfield HD7 5QH, Regno Unito
E-mail: thorntonross@medinformation.co.uk

Produttore

Zentiva ks, U Kabelovny 130, 10237 Praga 10, Repubblica Ceca

Questo foglio illustrativo non contiene tutto le informazioni sul medicinale. Se tu hai qualche domanda o non sei sicuro qualsiasi cosa, chiedi al medico o al farmacista.

Questo foglio illustrativo è stato rivisto l'ultima volta nel settembre 2021

STADA

93030022109
1060031705
ZV/649 66

