

Catapresan®**BOEHRINGER INGELHEIM**

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

OOMed**Che cos'è il Catapresan e quando si usa?**

Il Catapresan è un medicamento contro la pressione arteriosa troppo alta (ipertensione). Il Catapresan si può assumere soltanto su prescrizione del medico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Solamente il suo medico può decidere la cessazione della terapia col Catapresan, che deve avvenire diminuendo gradualmente la dose nello spazio di 2-4 giorni. Se si smette improvvisamente di assumere il Catapresan possono conseguire un rapido aumento della pressione arteriosa e/o nervosismo, tremore, mal di testa e nausea. Riprendendo il trattamento col Catapresan questi sintomi dovrebbero essere eliminati.

Quando non si può assumere il Catapresan?

Il Catapresan non si deve assumere in presenza di malattie del cuore con polso lento (sindrome del nodo sinusale, blocco AV di 2° o 3° grado), come pure in caso di provata ipersensibilità al principio attivo o ad un altro costituente del medicamento.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione del Catapresan?

In presenza di difunzioni dei reni, polso lento, disturbi dell'irrorazione sanguigna, malattie del cuore, depressioni, disturbi delle vie nervose (polineuropatia) e tendenza alla stitichezza il medico adeguerà la dose ed eventualmente la convocherà per controlli più frequenti.

Se porta lenti a contatto tenga presente che il Catapresan può diminuire la secrezione lacrimale.

Le compresse Catapresan contengono lattosio (zucchero del latte). I pazienti che soffrono di certi rari disturbi congeniti del metabolismo degli zuccheri non devono assumere questo farmaco.

Durante il trattamento col Catapresan possono manifestarsi degli effetti indesiderati, quali p.es. vertigini, sonnolenza e offuscamento della vista. Perciò occorre prudenza conducendo un veicolo o utilizzando delle macchine. Se in lei si manifestano gli effetti collaterali menzionati eviti di svolgere attività potenzialmente pericolose come condurre un veicolo o utilizzare delle macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie oppure assuma o applichi esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa), specialmente sonniferi e calmanti, medicinali contro la depressione (antidepressivi triciclici) o altre malattie psichiche (neurolettici), come pure certi farmaci per il cuore (anche digitalici), altri medicinali antiipertensivi, farmaci che aumentano l'escrezione urinaria (diuretici) ed «antireumatici» (come acido acetilsalicilico e altri FANS = farmaci antiinfiammatori non steroidei). Questi medicinali, presi in concomitanza, possono modificare l'effetto del Catapresan oppure peggiorarne la tollerabilità. Inoltre può manifestarsi una maggior sensibilità all'alcool.

Si può assumere il Catapresan durante la gravidanza o l'allattamento?

Solo il suo medico può decidere se lei può assumere il Catapresan durante la gravidanza. Il Catapresan non dev'essere assunto durante l'allattamento. Se è incinta, prevede una gravidanza oppure allatta ne informi il medico o il farmacista.

Come usare il Catapresan?

La posologia del Catapresan dev'essere stabilita individualmente dal medico, per cui lei deve attenersi esattamente alla sua prescrizione e *non modificare o cessare la terapia senza averlo consultato*.

Il Catapresan è destinato soltanto agli adulti.

Normalmente si inizia la terapia prendendo mezza compressa prima di coricarsi. Raramente occorrono più di 2 compresse al giorno (prese mattina e sera).

Eventuali aumenti della dose saranno stabiliti dal medico e generalmente avverranno a intervalli di 2-4 settimane ogni volta. Le compresse si devono deglutire senza masticarle con parecchia acqua. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere il Catapresan?

Con l'assunzione del Catapresan possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

All'inizio della terapia molto frequentemente possono manifestarsi una lieve sonnolenza, vertigini specialmente alzandosi in piedi ed anche secchezza della bocca. Di regola questi fenomeni collaterali scompaiono proseguendo la terapia: altrimenti ne informi il suo medico.

Sono stati osservati anche i seguenti effetti collaterali: stitichezza, nausea, vomito, dolori di ventre, inappetenza, aumento di peso, disturbi del sonno, mal di testa, svenimento, calo eccessivo della pressione arteriosa (tra l'altro alzandosi), polso lento o rapido, insufficienza cardiaca, diminuzione della libido (desiderio sessuale), disturbi della potenza sessuale, umore depresso, incubi, disturbi della percezione sensoriale, idee deliranti, agitazione, confusione, stati ansiosi, delirio, reazioni di ipersensibilità (allergie, prurito, orticaria, gonfiori tra l'altro al viso, alle labbra o alla lingua), stanchezza, malessere, aumento transitorio della glicemia (tasso sanguigno dello zucchero), diminuzione della secrezione lacrimale, offuscamento della vista, naso secco, caduta dei capelli, ingrossamento delle ghiandole mammarie (nell'uomo) e disturbi dell'irrorazione sanguigna, dolori muscolari e articolari, crampi alle gambe, pallore, febbre, modificazioni della funzionalità del fegato. In questi casi o se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

L'effetto dell'alcool, dei sonniferi o dei calmanti può essere potenziato, specialmente all'inizio della terapia.

Il medicamento non dev'essere conservato a più di 30 °C.

Come tutti i medicinali, il Catapresan va conservato fuori dalla portata dei bambini.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene il Catapresan?

1 compressa (divisibile) contiene: 150 microgrammi di clonidina cloridrato come principio attivo, nonché lattosio monoidrato e altre sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

33148 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile il Catapresan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 100 compresse (divisibili).

Titolare dell'omologazione

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basilea.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2012 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Publicato il 09.07.2013