

# Clonid-Ophtal® 1/8%

1,25 mg/ml collirio, soluzione

clonidina cloridrato

**Leggere attentamente l'intero foglio illustrativo** degli glicosidi cardiaci (preparati digitalici) prima di iniziare a usare questo medicinale in combinazione con alte dosi di clonidina. La bradicardia e gli AV possono aumentare perché contiene importanti Siverificano dissociazioni.

## Informazione.

Conservare il foglio illustrativo. Forse l'effetto di altri medicinali  
Ti piacerebbe rileggerlo più tardi? L'effetto di altri farmaci antipertensivi • Se ha ulteriori domande, contatti il medico o il farmacista.

medicinale che le è stato somministrato personalmente rinforzato dalla combinazione con clonidina. prescritta. Non somministrarla a terzi. Nei pazienti ipertesi (pazienti con pressione alta. Può causare ad alte persone una riduzione della dose può quindi essere dannosa), anche se presentano gli stessi sintomi che sono stati prescritti contemporaneamente a Voi. Potrebbero essere necessari farmaci.

• Se si notano effetti collaterali, potrebbe essere necessario che il medico o il farmacista assumano antidepressivi triciclici. si applica anche a Textarea 100x 340 che porta alla riduzione della pressione sanguigna alla clonidina. Effetti indesiderati non elencati in questo foglio illustrativo che riguardano il medicinale. sezione 4 Sistema nervoso centrale eccol.

## Cosa c'è in questo foglio illustrativo

Cos'è Clonid-Ophtal® 1/8% e a cosa serve? potenziare l'effetto sedativo della clonidina. Uso simultaneo farmacologicamente 1.

Cosa dovresti fare prima di usare la reserpina Metildopa, Guanfacina, Guanabenz o 2. non è utile.

Nota Clonid-Ophtal® 1/8%? Se usi anche altri colliri/  
3. Come usare Clonid-Ophtal® 1/8%? Gli unguenti per gli occhi dovrebbero essere usati tra 4. Quali effetti collaterali sono possibili? Per queste applicazioni è necessario mantenere un intervallo di tempo di circa 15 minuti.

sempre gli ultimi 6. Contenuto della confezione e informazione Gli unguenti per gli occhi dovrebbero essere essere applicato.

## 1. Cos'è Clonid-Ophtal® 1/8% e a cosa serve?

medicinale per il glaucoma, chiedi informazioni prima di usare questo medicinale oftalmico (medicinale per gli occhi).

### Clonid-Ophtal® 1/8% viene utilizzato

ipertensione oculare, è necessario utilizzare Clonid (aumento della pressione intraoculare) e Ophtal® 1/8% durante la gravidanza - tutte le forme di glaucoma (glaucoma). non applicare.

## 2. Cosa dovresti considerare prima di utilizzare il principio attivo Clonid-Ophtal® 1/8 % ?

Clonid-Ophtal® 1/8% Clonid-Ophtal® 1/8% fare domanda a. Se l'uso è necessario durante - bradicardia (battito cardiaco lento) allattamento al seno, l'allattamento al seno deve essere interrotto.

- Ipotesione (bassa pressione sanguigna), capacità di guidare e di usare macchinari - Sclerosi vascolare (ispessimento e indurimento). della parete vascolare), come con tutti i colliri, -sindrome del nodo senoatriale (aritmia cardiaca), visione offuscata temporanea o blocco AV II e III. Grado (un altro disturbo visivo compromette la capacità di guidare il cuore), di utilizzare macchine. Se - gravidanza e allattamento al seno,

Se - si verificano sensibilità (allergia) alla vista offuscata immediatamente dopo l'instillazione, non deve guidare clonidina cloridrato o una delle altre macchine menzionate nel paragrafo 6 finché questi componenti di questo medicinale non sono stati utilizzati.

## Avvertenze e precauzioni

medico o benzalconio cloruro Clonid-Ophtal® 1/8% contiene Sirivolga al

Farmacista prima di usare Clonid-Ophtal® 1/8% Questo medicinale contiene 0,003 mg. Gocce di benzalconio cloruro, per 2

Clonid-Ophtal® 1/8% è consentito negli occhi solo in quantità corrispondenti a 0,10 mg/ml. Instillato altrove, benzalconio cloruro può essere assunto per via morbida. Poiché l'ingestione di lenti a contatto può causare gravi avvelenamenti ai bambini, ciò può causare scolorimento delle lenti a contatto. può, il prodotto è in un luogo sicuro. È necessario conservare le lenti a contatto prima. Nei bambini piccoli, il solido di questo medicinale può evitare l'ingestione di una goccia o dell'altra e possono essere nuovamente messi a rischio solo dopo 15 minuti di suzione dal biberon. rappresentare.

Dopo l'inizio della terapia con clonidina, sono stati osservati cali della pressione sanguigna (ipotensione) e aumenti simultanei della pressione sanguigna quando si interrompe la clonidina. Pertanto, la pressione arteriosa deve essere monitorata all'inizio della terapia, ai cambiamenti della dose e 2 La fine della terapia deve essere monitorata con particolare attenzione.

Nota per i portatori di lenti a contatto Rimuovere le lenti a contatto prima dell'instillazione e reinserirle solo dopo 15 minuti al più presto.

## Uso di Clonid-Ophtal® 1/8% insieme ad altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali/ uso, hanno recentemente assunto/utilizzato altri medicinali o intendono assumere/ utilizzare altri medicinali.

Il benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi, soprattutto se ha gli occhi secchi o problemi alla cornea (lo strato trasparente nella parte anteriore dell'occhio). Rivolgersi al medico se si verificano sensazioni insolite, bruciore o dolore agli occhi dopo aver usato questo medicinale.

Clonid-Ophtal® 1/8% contiene fosfati Questo medicinale contiene 0,420 mg di fosfati per goccia, equivalenti a 14,57 mg/ml.

Se ha un grave danno alla cornea (lo strato trasparente nella parte anteriore dell'occhio), i fosfati durante il trattamento possono, in casi molorari, causare opacità (macchie opache) nella cornea a causa di depositi di calcio.

## 3. In che modo Clonid-Ophtal®

1/8% dovrebbe influenzare l'effetto degli altri medicinali ? Usi sempre questo medicinale esattamente. Se sta assumendo contemporaneamente antibiotici, può farlo dopo aver consultato il medico. Se non sei sicuro della bradicardia (frequenza cardiaca lenta), chiedi al tuo medico o al farmacista se non sei sicuro. Frequenza del polso e aritmie cardiache (ad esempio blocco AV). Anche se ingerito utilizzare sugli occhi.

Salvo diversa prescrizione, la dose raccomandata è di 1 goccia nell'occhio(i) affetto(i) 2-3 volte al giorno.

L'impostazione iniziale viene sempre effettuata con la concentrazione di clonidina più bassa (1/16%). La concentrazione più alta (1/8%) deve essere utilizzata solo se esiste una determinata esigenza terapeutica.

I potenziali effetti collaterali sistemici possono essere ridotti esercitando una pressione sul condotto lacrimale con il dito per circa 1 minuto dopo il uso.

Se hai usato più Clonid-Ophtal® 1/8% quanto dovresti

Un singolo sovradosaggio accidentale di Clonid-Ophtal® 1/8% nell'occhio non è ancora causato da nessuno degli effetti collaterali noti.

L'effetto terapeutico sull'occhio può essere migliorato (avvelenamento dopo dosi elevate).

I portatori di lenti a contatto che ingeriscono quantità maggiori dovrebbero spesso seguire Clonid-Ophtal® 1/8%, il che può comportare una riduzione osservata del film lacrimale. **Textarea 100 x 340** Si verificano segni di malattia: osservare.

Il quadro clinico mostra, in casi molto rari, a seconda del peso corporeo del paziente ed dell'entità dell'intossicazione (quantità ingerita) un danno corneale pronunciato durante il trattamento con colliri contenenti fosfati, essenzialmente cardiovascolare (collirio per il cuore, opacizzazione della cornea e influenza sulla vasi sanguigni) e depositi di calcio.

Il sistema nervoso centrale che colpiscono **Segnalazione degli effetti collaterali**

Sintomi: irrequietezza, mal di testa, vertigini, nausea, vomito, pallore, costrizione della pupilla (presenti in caso di qualche effetto collaterale, contatti il medico o farmacista).

reflessi alla luce), secchezza delle fauci, sedazione fino alla sonnolenza, sonnolenza, bassa pressione sanguigna, disturbi ortostatici, vertigini, disturbi dell'equilibrio, lentezza battito cardiaco, aritmie cardiache (blocchi AV), riflessi indeboliti assenti, ipotermia (bassa temperatura).

Dopo che le dosi elevate sono state somministrate, anche

Possibili aumenti della pressione sanguigna. Nei casi più gravi depressione respiratoria con brevi fasi di apnea (fasce di arresto respiratorio) perdita di coscienza.

#### Misure terapeutiche

Oltre alle misure generali (rimozione primaria del veleno, ad es. induzione del vomito, lavanda gastrica), i parametri vitali devono essere monitorati ed eventualmente corretti in condizioni di terapia intensiva: se necessario, ventilazione artificiale, pacemaker esterno, IV-

Somministrazione di simpaticomimetici e/o espansori plasmatici. In caso di bradicardia, somministrazione sottocutanea di atropina sotto controllo ECG.

#### antidoto

Il benefici dei bloccanti (tolazolina, fentolamina) come antidoto specifico è controverso, ma non si prevede alcun danno.

Tolazolina: (ottenere ad esempio da una farmacia internazionale)

10 mg di tolazolina IV o 50 mg per via orale contrastano l'effetto di circa 0,600 mg di clonidina cloridrato; A seconda dell'effetto, è possibile la somministrazione ripetuta.

Nei bambini, 5-10 mg di tolazolina per via orale ogni 15 minuti seconda dei risultati clinici.

L'emodialisi è possibile, ma la sua efficacia è limitata perché la clonidina può essere dializzata solo in misura limitata.

Dovrebbe ad esempio, se un bambino ha ingerito il contenuto di un flacone di Clonid-Ophtal® 1/8%, chiamare immediatamente il medico più vicino per chiedere aiuto.

Se dimentica di usare Clonid-Ophtal® 1/8%

Non utilizzare una dose doppia se si è dimenticato l'applicazione precedente. Continuare l'uso regolare agli intervalli consigliati dal medico prima possibile.

Se smetti di usare Clonid-Ophtal® 1/8%

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Imprenditore e produttore farmaceutico

Dott. Gerhard Mann  
chem.-pharm.Fabrik GmbH  
Brunsbüttel Damm 165/173  
13581 Berlino  
E-mail: kontakt@bausch.com

## 4. Quali effetti collaterali sono possibili?

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Comune** (può interessare fino a 1 persona su 10)

Affaticamento, secchezza delle fauci, calo della pressione sanguigna e vertigini (dose-dipendenti e solitamente solo temporanei all'inizio della terapia), bruciore agli occhi.

**Non comune** (può interessare fino a 1 persona su 100)

Mal di testa, nausea, disturbi visivi, sensazione di corpo estraneo, arrossamento degli occhi.

**Raro** (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

Stitichezza delle feci (stitichezza), formicolio e sensazione di freddo agli arti (parestesia), disturbi del sonno, reazioni allergiche, battito cardiaco lento (bradicardia) (solo in casi di sovradosaggio)

Stitichezza delle feci (stitichezza), formicolio e sensazione di freddo agli arti (parestesia), disturbi del sonno, reazioni allergiche, battito cardiaco lento (bradicardia) (solo in casi di sovradosaggio)

del film lacrimale. **Textarea 100 x 340** osservare.

del peso corporeo del paziente ed dell'entità del danno corneale pronunciato durante il trattamento con colliri (collirio per il cuore, opacizzazione della cornea e influenza sulla vasi sanguigni) e depositi di calcio.

che colpiscono **Segnalazione degli effetti collaterali** contatti il medico o farmacista.

Ciò vale anche per gli effetti collaterali non elencati in questo foglio illustrativo. Puoi anche segnalare direttamente gli effetti collaterali

Istituto federale per farmaco E

per i dispositivi medici  
Dip. Farmacovigilanza  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 8  
53175 Bonn

Sito web: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

spettacolo.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come deve essere conservato Clonid-Ophtal® 1/8%?

Tenere questo medicinale fuori dalla portata ed alla portata dei bambini.

È possibile utilizzare questo medicinale in base alla data di scadenza utilizzabile entro la data riportata

Non sul contenitore e sulla scatola esterna. utilizzare la data di scadenza specificata. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Dopo la prima apertura di Clonid-Ophtal® 1/8% può essere utilizzato per un massimo di 6 settimane.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non gettare mai i medicinali nell'acqua di scarico (ad esempio nel WC o nel lavandino). Chiedi alla tua farmacia come eliminare il medicinale quando non lo usi più. Contribuisci a proteggere il nostro ambiente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito

[www.bfarm.de/arzneimittelsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelsorgung).

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**Cosa contiene Clonid-Ophtal® 1/8%.**

- Il principio attivo è: clonidina cloridrato

1 ml di collirio contiene 1,25 mg di clonidina cloridrato.

Gli altri componenti sono: benzalconio cloruro; sodio diidrogeno fosfato diidrato; Sodio monoidrogeno fosfato dodecaidrato (Ph.

EURO.); ipromelosi; Acqua per preparazioni iniettabili.

**Descrizione dell'aspetto di Clonid-Ophtal® 1/8% e contenuto della confezione**

Clonid-Ophtal® 1/8% è una soluzione giallo pallido.

Sono disponibili confezioni da 10 ml di collirio e confezioni da 3 x 10 ml di collirio per taccone contagocce.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Questo foglio illustrativo è stato ristampato l'ultima volta nel marzo 2023.

Necessita di prescrizione. Approvazione: 6011506.01.00

**DR.WINZER PHARMA GMBH, 13581 Berlino**