

FOGLIO ILLUSTRATIVO:  
INFORMAZIONI PER L'UTENTE

# Corgard 80 mg Compresse

Nadolol



**È questo volantino  
difficile da  
vedere o leggere?  
Telefono 0845  
372 7101 per aiuto**

Legga attentamente questo foglio prima di iniziare a prendere questo medicinale.

- Conservare questo foglio. Potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo.
- Se ha ulteriori domande, si rivolga al medico o al farmacista.

• Questo medicinale le è stato prescritto. Non lo dia ad altri. Potrebbe danneggiarli, anche se i loro sintomi sono gli stessi dei suoi.

• Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

In questo volantino:

1. Che cosa sono le compresse di Corgard e a cosa servono
2. Cosa deve sapere prima di prendere Corgard compresse
3. Come prendere Corgard compresse
4. Possibili effetti collaterali
5. Come conservare le compresse di Corgard
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

## 1. Che cosa sono le compresse di Corgard e a cosa servono

Corgard compresse contiene un medicinale chiamato nadololo. Questo appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati beta-bloccanti. Funziona rallentando la frequenza cardiaca e abbassando la pressione sanguigna.

Le compresse di Corgard sono utilizzate per:

- Dolore al torace (angina)
- Ipertensione
- Battiti cardiaci irregolari o insolitamente veloci (aritmia)
- Sintomi di un'ipertensione tiroidea
- Arrestare gli attacchi di emicrania

## 2. Cosa deve sapere prima di prendere Corgard compresse

**Non prenda Corgard compresse se:**

- × Se è allergico (ipersensibile) al nadololo o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Corgard Tablets (vedere paragrafo 6: Altre informazioni).
- × I segni di una reazione allergica includono: eruzione cutanea, problemi di deglutizione o respirazione, gonfiore delle labbra, del viso, della gola o della lingua
- × Ha o ha avuto asma o respirazione difficoltosa
- × Ha un battito cardiaco molto lento
- × Ha problemi cardiaci - ha difficoltà a respirare e a cavare le gonfie

Non prenda questo medicinale se una delle condizioni sopra riportate la riguarda. Se non è sicuro, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Corgard compresse.



## Avvertenze e precauzioni

**Faccia particolare attenzione con Corgard compresse**  
Consulti il medico o il farmacista prima di prendere il medicinale se:

- × Ha problemi cardiaci
- × Ha problemi respiratori a causa di un lungo periodo di problemi polmonari (chiamati "bronchite" o "enfisema")
- × Ha il diabete. Corgard compresse può causare bassi livelli di zucchero nel sangue anche in pazienti non diabetici come bambini, anziani e coloro che stanno digiunando

- × Ha problemi al fegato
- × Ha una ghiandola tiroidea iperattiva
- × Ha problemi ai reni
- × Ha una storia di gravi allergie

Se non è sicuro quanto sopra riportato da riguardi, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Corgard compresse.

## Prove di stress

L'accuratezza dei test da sforzo (utilizzati dal medico per scoprire se ha una diminuzione del flusso sanguigno al muscolo cardiaco) è influenzata dall'uso di beta-bloccanti, compreso Corgard.

## Operazioni o anestesia

Informi il medico o il dentista se sta assumendo Corgard compresse se sta per essere sottoposto ad un'anestesia o ad un intervento chirurgico (compreso un intervento di chirurgia dentale).



## Altri medicinali e Corgard compresse

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale. Ciò include medicinali acquistati senza prescrizione medica, compresi medicinali a base di erbe. Questo perché Corgard compresse può influenzare il funzionamento di altri medicinali. Anche alcuni medicinali possono influenzare il funzionamento di Corgard compresse.

In particolare, informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

- Compresse diuretiche (diuretici) come l'amiloride
- Insulina o compresse per il trattamento del diabete
- Medicinali per l'ipertensione alta (come guanetidina o idralazina)
- Medicinali per la depressione (inibitori della monoamino ossidasi) come la fenelzina
- Medicinali usati per l'emicrania (come clonidina, ergotamina o metisergide)
- Medicinali usati per l'asma, i problemi intestinali di morbo di Parkinson (come atropina, ipratropio e benztropina)

- Medicinali per il dolore toracico (angina) come verapamil, nifedipina e diltiazem
- Medicinali usati per problemi cardiaci - come lidocaina (usata anche come anestetico locale), procainamide, isoprenalina, verapamil, adrenalina (usata anche per allergie gravi), noradrenalina, amiodarone, disopiramide e chinidina

- Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) - utilizzati per alleviare il dolore (come ibuprofene, naprossene, diclofenac, indometacina e piroxicam)
- Medicinali utilizzati per problemi mentali (medicinali antipsicotici) - come clorpromazina, flufenazina e aloperidolo

- Medicinali utilizzati per aumentare la pressione sanguigna (vasocostrittori - utilizzati per restringere i vasi sanguigni) - come efedrina e fenilefrina
- Fingolimod - un medicinale utilizzato per la sclerosi multipla
- Diltiazem poiché può portare ad un aumento del rischio di depressione.

## Gravidanza e allattamento

Si rivolga al medico prima di prendere questo medicinale se è incinta, potrebbe rimanere incinta o pensa di poter essere incinta.

Non deve allattare se sta assumendo Corgard compresse. Questo perché piccole quantità possono passare nel latte materno. Se sta allattando o sta pianificando di allattare, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale se è in gravidanza o sta allattando.



## Guida all'uso di macchinari

Potrebbe sentirsi stanco o avere vertigini mentre assume Corgard compresse. Se ciò accade, non guidi né utilizzi strumenti macchinari.



## 3. Comprendere Corgard compresse

Prenda sempre Corgard compresse esattamente come le ha detto il medico. Dovresti consultare il tuo medico o il farmacista se non sei sicuro.

## Prendendo questo medicinale

- Prenda questo medicinale per via orale
- Deglutire le compresse con un sorso d'acqua
- Se ritiene che l'effetto del medicinale sia troppo debole o troppo forte, non modifichi la dose da solo, ma chiedi al medico

## La dose abituale:

La dose di Corgard Tablets dipende dalle sue necessità e dalla malattia da trattare. Il tuo medico ti consiglierà.

## Dolore al petto (angina)

- Da 40 mg (mezza compressa) a 160 mg (2 compresse) al giorno

## Iperensione

- Da 80 mg (1 compressa) a 240 mg (3 compresse) ogni giorno

## Battiti cardiaci irregolari o insolitamente veloci (aritmie)

- Da 40 mg (mezza compressa) a 160 mg (2 compresse) al giorno

## Ferma gli attacchi di emicrania

- Da 40 mg (mezza compressa) a 160 mg (2 compresse) al giorno

## Tiroide iperattiva

- Da 80 mg (1 compressa) a 160 mg (2 compresse) ogni giorno

## Pazienti anziani e pazienti con problemi renali

Se necessario, il medico può decidere di ridurre la dose di Corgard Tablets.

## Bambini

Corgard compresse non deve essere somministrato ai bambini.

## Se prende più compresse di Corgard di quanto deve

Se prende più Corgard compresse di quanto deve, informi il medico o i soccorsi immediati al pronto soccorso dell'ospedale. Porta con te la confezione del medicinale. In questo modo i medici sapranno cosa hai preso. Possono verificarsi i seguenti effetti: sensazione di vertigine o debolezza, difficoltà di respirazione o respiro sibilante.

## Se dimentica di prendere Corgard compresse

Non prenda una dose doppia per compensare una dimenticanza di dose.

## Se interrompe il trattamento con le compresse di Corgard

Continui a prendere Corgard compresse finché il medico non dice di interrompere. Se interrompe improvvisamente il trattamento, la sua malattia potrebbe peggiorare. Quando il medico dice che puoi interrompere l'assunzione di Corgard Tablets, dev'essere graduale. Il tuo medico ti aiuterà a farlo.



Se ha ulteriori domande sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. Possibili effetti collaterali

Come tutti i medicinali, Corgard Tablets può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

## Smetta di prendere Corgard compresse e consulti un medico se i rechi immediatamente in ospedale:

- Hai una reazione allergica. I segni possono includere: eruzione cutanea, problemi di deglutizione o di respirazione, gonfiore delle labbra, del viso, della gola o della lingua
- Informi il medico il prima possibile se manifesta uno qualsiasi dei seguenti effetti collaterali:  
**Effetti collaterali comuni riportati** (possono interessare fino a 1 persona su 10)
  - Dolore al petto e sensazione di debolezza o vertigini. Questi potrebbero essere segni di problemi cardiaci.
  - Frequenza cardiaca lenta
  - Sensazione di vertigini o debolezza. Questi potrebbero essere segni di bassa pressione sanguigna

## Effetti collaterali riportati non comuni

- (possono interessare fino a 1 persona su 100)
  - Dolore allo stomaco, sensazione di stomaco pieno o gonfiore, flatulenza, costipazione, diarrea, indigestione e perdita di appetito
  - Cambiamenti nel comportamento
  - Discorso confuso
  - Tosse e naso chiuso
  - Ronzio nelle orecchie
  - Mal di testa
  - Sensazione di malessere
  - Problemi respiratori come l'asma
  - Secchezza della bocca, degli occhi e della pelle

- Aumento di peso
- Sudorazione
- Difficoltà a dormire o a mantenere un'erezione, o ad eiaculare (impotenza)

- Mancanza di interesse per le attività sessuali (libido)

## Altri effetti indesiderati con frequenza non nota

- frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili)
- Sentirsi nervoso, ansioso, tremante o sudato. Questi potrebbero essere segni di bassi livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia)
- Infiammazione, irritazione o gonfiore causati dal sangue fluire allo stomaco
- Difficoltà a dormire (insonnia)
- Vedere o sentire cose che non esistono (allucinazioni), confusione, visione offuscata
- Depressione e perdita di memoria a breve termine
- Febbre e mal di gola
- Una sensazione di freddo o intorpidimento alla base delle mani o dei piedi
- Sensazioni cutanee insolite come intorpidimento, formicolio, pizzicore, bruciore o strisciamento sulla pelle
- Perdita dei capelli (di solito ricrescono quando si smette di usare il medicinale)
- Cambiamenti nella conta delle cellule del sangue evidenziati dagli esami del sangue. Ciò può portare a eruzioni cutanee o sensazione di debolezza

## Analisi del sangue

I risultati di alcuni esami del sangue possono mostrare livelli di enzimi epatici più alti del normale. Gli esami del sangue possono anche mostrare livelli di globuli bianchi più alti del normale.

Se manifesta qualsiasi effetto indesiderato o se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o dura più di qualche giorno, si rivolga al medico o al farmacista. Ciò include qualsiasi possibile effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo.

## Segnalazione degli effetti collaterali

Se manifesta qualsiasi effetto collaterale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Ciò include qualsiasi possibile effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo. Puoi anche segnalare gli effetti collaterali direttamente tramite lo Yellow Card Scheme all'indirizzo: [www.mhra.gov.uk/whitecard](http://www.mhra.gov.uk/whitecard) o cercare MHRA Yellow Card su Google Play o sull'Apple App Store. Segnalando gli effetti indesiderati puoi contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come conservare le compresse di Corgard

Tenere fuori dalla portata ed alla vista dei bambini.

Non prenda Corgard compresse dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

I medicinali non devono essere smaltiti tramite le acque reflue o i rifiuti domestici. Chiedi al tuo farmacista come smaltire i medicinali non più necessari. Queste misure aiuteranno a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### Cosa contiene Corgard compresse:

- Ogni compressa contiene 80 mg di principio attivo, nadololo
- Gli altri componenti sono cellulosa microcristallina e magnesio stearato

### Descrizione dell'aspetto di Corgard compresse e contenuto della confezione

Le compresse di Corgard 80 mg sono bianche, a forma di capsula, con rigatura, con inciso "80" su un lato.

Sono forniti in scatola da 28 compresse.

### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:  
Sanofi

410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG4 9PT, Regno Unito  
Tel: 0845 372 7101  
e-mail: [uk-medicalinformation@sanofi.com](mailto:uk-medicalinformation@sanofi.com)

### Produttore

Sanofi-aventis Sp. z o o  
Impianto di produzione e distribuzione di farmaci  
ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów, Polonia

Questo foglio illustrativo non contiene tutte le informazioni sul medicinale.

Se avete domande o non siete sicuri di qualcosa, chiedete al vostro medico o al farmacista.

Questo foglio illustrativo è stato rivisto l'ultima volta nel luglio 2019

Corgard è un marchio registrato.

© Sanofi, 1994-2019

Scala 100%  
CORCARD - volantino UK  
148 x 315 mm  
codice: 753166  
Laeto: 883  
Caratteri: Ocean Sans pt, Wingdings, Symbol  
Pianta Rzeszów  
Versione n°01  
Data: 04.2019