

Daraprim®

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

OOMed

Che cos'è Daraprim e quando si usa?

Daraprim si usa in combinazione con un antibiotico (sulfadiazina o un altro sulfamidico adatto) per il trattamento della toxoplasmosi.

Il principio attivo contenuto in Daraprim altera il metabolismo dell'agente patogeno responsabile della toxoplasmosi e ne impedisce così la sua moltiplicazione.

Daraprim deve essere usato solo su prescrizione del medico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento lo è stato prescritto dal medico per il trattamento della sua malattia attuale.

L'antibiotico contenuto in Daraprim non agisce contro tutti i microrganismi che causano malattie infettive. L'uso di un antibiotico mal scelto o non correttamente dosato può causare complicazioni. Quindi, non lo utilizzi mai di propria iniziativa per il trattamento di altre malattie o di altre persone.

Quando non si può assumere Daraprim?

Daraprim non si può assumere in caso di ipersensibilità nota o supposta nei confronti del principio attivo pirimetamina o di un altro componente del medicamento.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Daraprim?

Se lei soffre di un disturbo epatico o renale, di epilessia o di una carenza di acido folico, il medico le prescriverà Daraprim con particolare prudenza e sorveglierà attentamente l'andamento della terapia.

Durante il trattamento con Daraprim, il medico le prescriverà anche calcio folinato o acido folico, per limitare gli effetti collaterali del preparato sull'emopoiesi (processo di formazione delle cellule del sangue).

Dato che Daraprim deve essere somministrato insieme ad un antibiotico (sulfamidico), si consiglia di accompagnare l'assunzione con sufficiente quantità di liquido.

La somministrazione contemporanea di Daraprim e determinati medicinali (cotrimoxazolo, trimetoprim, proguanile, zidovudina o citostatici) può inibire ulteriormente il metabolismo dell'acido folico. La somministrazione contemporanea di detti medicinali andrebbe quindi effettuata sotto stretta sorveglianza medica. L'assunzione contemporanea di lorazepam (una benzodiazepina) e di pirimetamina può provocare lievi danni al fegato. L'efficacia o la tossicità di altre sostanze (per esempio del chinino o della warfarina) possono risultare influenzate dalla somministrazione contemporanea di pirimetamina.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Daraprim durante la gravidanza o l'allattamento?

Se lei ha in corso o in programma una gravidanza, dovrebbe assumere Daraprim soltanto dopo avere consultato il medico. Voglia pertanto informare il medico, se ha in corso o in programma una gravidanza.

Daraprim non va impiegato durante i primi tre mesi di gravidanza.

Le donne incinte sottoposte al trattamento con Daraprim devono assumere contemporaneamente un preparato a base di acido folico.

Da molti anni Daraprim viene prescritto in combinazione con un antibiotico (sulfamidico) per il trattamento della toxoplasmosi a partire dal quarto mese di gravidanza. Il medico discuterà ampiamente con lei i rischi di un'infezione da toxoplasmi contratta durante la gravidanza, nonché i vantaggi e gli svantaggi del trattamento.

Dato che il principio attivo contenuto in Daraprim viene eliminato anche nel latte materno, si dovrebbe rinunciare ad allattare durante il trattamento con il preparato.

Come usare Daraprim?

Per il trattamento della toxoplasmosi, Daraprim si somministra insieme ad un antibiotico (sulfadiazina o un altro sulfamidico adatto). Il medico stabilirà le dosi di Daraprim e del sulfamidico necessarie per la cura di ogni singolo caso.

Di solito, Daraprim per adulti e bambini sopra i 6 anni si somministra nel modo seguente: 4 compresse il 1° giorno di cura, in seguito 1-2 compresse al giorno. Normalmente il trattamento dura 3-6 settimane. Il medico deciderà quando sospendere la terapia.

Per i lattanti e i bambini, il dosaggio verrà stabilito dal medico in rapporto al peso corporeo.

Una volta iniziata, la terapia con antibiotici dovrebbe essere proseguita per tutta la durata prescritta dal medico. I sintomi della malattia spesso scompaiono prima che l'infezione sia guarita completamente. Un periodo di somministrazione insufficiente o una cessazione prematura del trattamento può avere come conseguenza un riaccendersi dell'affezione.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Daraprim?

Durante la somministrazione di Daraprim possono comparire i seguenti effetti collaterali: alterazione dell'emopoiesi. Il medico perciò prescriverà calcio folinato o acido folico insieme a Daraprim, nell'intento di limitare l'incidenza di tale effetto indesiderato. Qualora lei osservasse su di sé perdite di sangue o lividi, mal di gola, febbre o forte stanchezza, deve consultare subito il medico.

All'inizio del trattamento possono verificarsi anche nausea, crampi addominali, vomito e diarrea. Tuttavia, questi sintomi sono suscettibili di scomparire di nuovo spontaneamente, senza che sia necessario interrompere il trattamento. Effetti collaterali più rari sono: mal di testa, senso di vertigini, secchezza della bocca e della gola, febbre, malessere, eruzioni cutanee o alterazione del colore della cute, nonché depressione.

Se compaiono tali sintomi, è opportuno che lei si metta in contatto col suo medico.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Daraprim compresse va conservato a una temperatura non superiore a 25 °C, al riparo dalla luce e fuori dalla portata dei bambini.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Una volta terminato il trattamento, le compresse restanti vanno riportate al medico o al farmacista, perché le eliminino.

Cosa contiene Daraprim?

1 compressa di Daraprim contiene 25 mg di pirimetamina come principio attivo, nonché lattosio monoidrato, amido di mais, amido ossidato, stearato di magnesio e diottilsolfosuccinato sodico come sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

20964 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Daraprim? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della ricetta medica non rinnovabile.

Compresse da 25 mg: 30.

Titolare dell'omologazione

GlaxoSmithKline AG, 3053 Münchenbuchsee.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2014 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Publicato il 17.03.2015