

Eltroxin®-LF

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

OOMed**Che cos'è Eltroxin-LF e quando si usa?**

L'Eltroxin-LF contiene l'ormone della tiroide levotiroxina e viene utilizzato per la terapia delle malattie della tiroide in cui la produzione di questo ormone è ridotta.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Lo si può prendere solo su prescrizione del medico. Eltroxin-LF non contiene del lattosio.

Quando non si può usare Eltroxin-LF?

In caso d'iperfunzione della tiroide, cioè in caso di eccessiva produzione di ormoni tiroidei, in caso di infarto recente del miocardio, di angina pectoris grave, di insufficienza cardiaca o di disturbi non curati della funzionalità delle ghiandole surrenali, come pure in caso di ipersensibilità all'Eltroxin-LF, questo non deve essere usato.

Non esiste alcuna prova che gli ormoni tiroidei abbiano un effetto di riduzione di peso nei pazienti obesi con una normale funzionalità della tiroide. Per questa ragione, e inoltre essendo dimostrato che delle dosi elevate possono causare degli effetti collaterali gravi, l'Eltroxin-LF non è appropriato e quindi non può essere somministrato per il trattamento contro l'obesità.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Eltroxin-LF?

In caso di funzione insufficiente dell'ipofisi, o qualora le ghiandole surrenali mostrassero per altri motivi un'insufficienza, il medico le prescriverà probabilmente un trattamento supplementare con ormoni surrenali.

Il medico deve assolutamente sapere se lei è affetto da malattie cardiache, da diabete o da ipertensione arteriosa.

Speciale attenzione occorre in caso di assunzione contemporanea dei farmaci seguenti:

I medicinali contenenti alluminio contro l'acidità e il bruciore di stomaco (cosiddetti antiacidi, come, ad esempio il sucralfato) nonché i medicinali contenenti ferro o carbonato di calcio, possono inibire l'assorbimento della levotiroxina dall'intestino. La loro somministrazione può dunque avvenire soltanto 2 ore dopo di quella dell'Eltroxin-LF. Farmaci che inibiscono l'assorbimento del colesterolo dall'intestino (per esempio la colestiramina) possono anche inibire l'assorbimento della levotiroxina dall'intestino. La loro somministrazione può dunque avvenire soltanto 5 ore dopo di quella dell'Eltroxin-LF.

La somministrazione di contraccettivi orali o di medicinali quali antiepilettici (carbamazepina, fenitoina, phenobarbital) e l'antibiotico rifampicina possono ridurre o indebolire la durata dell'effetto dell'Eltroxin-LF.

Altri medicinali come l'amiodarone contro i problemi del ritmo cardiaco o il betabloccante propranololo possono invece rallentare la degradazione della levotiroxina nel fegato e così aumentare la durata del suo effetto.

I medicinali a base di litio utilizzati nel trattamento delle malattie psichiatriche, così come i medicinali contenenti iodio inibiscono la liberazione degli ormoni tiroidei nella tiroide.

Perciò, se prende tali medicinali bisogna sorvegliarne con cura l'influsso sulla terapia coll'Eltroxin-LF.

Analogamente, la somministrazione dell'Eltroxin-LF può modificare (potenziare o diminuire) l'efficacia di altri medicinali. Ad esempio, l'effetto ipoglicemizzante degli antidiabetici orali è diminuito. Invece l'effetto degli anticoagulanti, dei glucosidi cardiaci e di altri farmaci è aumentato e l'inizio dell'azione di medicinali antidepressivi (di tipo tricyclico) è accelerato.

Informi perciò il medico o il farmacista se soffre di altre malattie, è allergico o prende altri medicinali sia ad uso interno che esterno (anche di propria iniziativa!).

Si può somministrare Eltroxin-LF durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza la terapia con l'Eltroxin-LF non va interrotta. Il suo medico fisserà il dosaggio durante la gravidanza o l'allattamento. In ogni caso informi il suo medico se è incinta o se allatta.

Come usare Eltroxin-LF?

La dose giornaliera necessaria è individuale e viene stabilita dal medico.

L'intera dose giornaliera va presa al mattino con un po' di liquido, 30 minuti prima della colazione.

La dose iniziale abituale per gli adulti è di 0,05-0,1 mg al giorno e viene aumentata di 0,05 mg ad intervalli di 3-4 settimane fino alla normalizzazione del metabolismo. La dose di mantenimento minima si situa tra 0,1 e 0,2 mg. Per i pazienti di età superiore ai 50 anni, con malattie cardiache o con grave insufficienza della tiroide la dose iniziale è minore.

Per i bambini è particolarmente importante che la posologia sia stabilita individualmente dal medico e controllata con cura. Per i bambini piccoli di meno di un anno la dose corrispondente (mezzo compresso) va, se necessario, somministrata in forma adeguata (con pappa o liquido), facendo attenzione che sia presa tutta la dose.

Non modifichi di sua iniziativa la posologia del medicamento che le è stata prescritta. Se ritiene che il farmaco agisca troppo poco o troppo ne parli al medico o al farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Eltroxin-LF?

Le manifestazioni seguenti sono conseguenza di un aumento troppo rapido della posologia all'inizio della terapia o di una posologia troppo elevata: nervosismo, insonnia, diarrea, eliminazione di zucchero nell'urina, leggero tremore muscolare, debolezza muscolare, sudorazione, mal di testa, forte calo ponderale, polso accelerato, aritmie cardiache, dolori improvvisi alla cassa toracica della durata di alcuni secondi o minuti (angina pectoris).

Se si manifestano questi effetti indesiderati ne informi il medico. Generalmente essi scompaiono riducendo la dose o interrompendo la terapia per alcuni giorni. Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare l'Eltroxin-LF a temperatura non superiore a 25°C, al riparo dalla luce, nella confezione accuratamente chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico e il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Eltroxin-LF?

Una compressa contiene come principio attivo 0,05 mg rispettivamente 0,1 mg di levotiroxina e sostanze ausiliari. Eltroxin-LF non contiene del lattosio.

Numero dell'omologazione

29812 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Eltroxin-LF? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Eltroxin-LF 0,05 mg: 100 compresse

Eltroxin-LF 0,1 mg: 100 compresse

Titolare dell'omologazione

sigma-tau Pharma AG, Zofingen

Fabbricante

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Germania

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2011 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).