

Famotidin-ratiopharm® 40 mg compresse rivestite con film

Ingrediente attivo: famotidina

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

Leggi attentamente questo foglio prima di prendere questo

Droga perché contiene informazioni importanti.

- Conserva questo foglio. Potresti rileggerlo più tardi.
- In caso di ulteriori domande, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Non lo dia a terzi. Potrebbe danneggiarli, anche se i loro segni di malattia sono uguali ai suoi.
- In caso di effetti collaterali, si rivolga al medico o al farmacista. Questo vale anche per Effetti collaterali non elencati in questo foglio. Vedi sezione 4

Cosa c'è in questo opuscolo

1. Che cos'è Famotidin-ratiopharm® 40 mg ea cosa serve?
2. A cosa dovresti prestare attenzione prima di prendere Famotidin-ratiopharm® 40 mg?
3. Come prendere Famotidin-ratiopharm® 40 mg?
4. Quali effetti collaterali sono possibili?
5. Come conservare Famotidin-ratiopharm® 40 mg
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1 . Che cos'è Famotidina Teva 40 mg ea cosa serve?

Famotidin-ratiopharm® 40 mg è un agente gastrointestinale e appartiene al gruppo dei cosiddetti recettori dell'istamina H₂ .
bloccanti che riducono la secrezione di acido gastrico.

Famotidin-ratiopharm® 40 mg è usato per trattare le seguenti malattie, in cui una

La riduzione della secrezione di acido gastrico (secrezione di acido gastrico) è indicata:

- ulcere duodenali (ulcere duodenali, ulcere duodenali)
- ulcere gastriche benigne (ulcere gastriche, ulcere ventricolari)
- Sindrome di Zollinger-Ellison

2 . Cosa dovresti fare attenzione prima di prendere Famotidine ratiopharm 40 mg?

Famotidin-ratiopharm® 40 mg non deve essere assunto,

- se è allergico alla famotidina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nella sezione 6 Medicinale.
- se è mai stato ipersensibile a un altro antagonista del recettore dell'istamina H₂ , perché è stata osservata ipersensibilità crociata in questa classe di sostanze.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Famotidin-ratiopharm® 40 mg.

Se ha una funzionalità renale compromessa, la dose giornaliera deve essere ridotta (vedere 3. "Come va Assumere Famotidin-ratiopharm® 40 mg? ").

Se i sintomi rispondono al trattamento con Famotidin-ratiopharm® 40 mg, la neoplasia è esclusa dell'ulcera. Prima del trattamento con famotidina, deve passare un tumore maligno dell'ulcera gastrica sono escluse misure diagnostiche adeguate.

L'uso di Famotidin-ratiopharm® 40 mg non è appropriato per i gastrointestinali minori
Reclami, ad es. B. stomaco nervoso.

Lo stato di *Helicobacter pylori* deve essere determinato in pazienti con ulcera duodenale e gastrica .
Per i pazienti positivi all'*Helicobacter pylori* , il batterio *Helicobacter* viene eliminato ove possibile
Lottare per *pylori* attraverso la terapia di eradicazione.

bambini

L'esperienza sulla sicurezza e l'efficacia della famotidina nei bambini è insufficiente.
Pertanto, i bambini non devono essere trattati con Famotidin-ratiopharm® 40 mg.

Altri medicinali e Famotidina Teva 40 mg

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali, recentemente altri
Ha preso o prevede di assumere o utilizzare altri medicinali.

Con l'uso simultaneo di sostanze il cui assorbimento è influenzato dall'acidità dello stomaco
a considerare il loro possibile assorbimento nel flusso sanguigno. Nel caso di atazanavir (un medicinale
per il trattamento delle infezioni da HIV), ketoconazolo e itraconazolo (medicinali per il trattamento dei funghi
malattie) questo può essere ridotto. Il ketoconazolo deve quindi essere assunto circa 2 ore prima
Somministrazione di famotidina.

Informi il medico se sta assumendo il seguente medicinale:

- carbonato di calcio, se usato come medicinale per il trattamento di alti livelli di fosfato nel sangue (iperfosfatemia)
è usato nei pazienti in dialisi.

Se prende antiacidi (medicinali per legare l'acido dello stomaco) e famotidina allo stesso tempo

L'assunzione di famotidina nel flusso sanguigno può essere ridotta. Pertanto Famotidin-ratiopharm® 40 mg dovrebbe essere circa
Da assumere 2 ore prima di un antiacido.

L'assunzione di sucralfato (un medicinale per ridurre l'acidità di stomaco) allo stesso tempo riduce
prendendo famotidina. Pertanto, il sucralfato deve essere sempre somministrato ogni 2 ore dopo la somministrazione di famotidina
essere preso.

L'assunzione di probenecid (un medicinale per ridurre la quantità di acido urico nel sangue) può causare l'escrezione
ritardato dalla famotidina. Per l'uso simultaneo di Famotidin-ratiopharm® 40 mg e probenecid
dovrebbe essere evitato.

Gravidanza e allattamento

In caso di gravidanza o allattamento, pensa di poter essere incinta o sta pianificando di avere un bambino
chieda consiglio al medico o al farmacista prima di assumere questo medicinale.

gravidanza

L'esperienza sull'uso di Famotidin-ratiopharm® 40 mg in donne in gravidanza è limitata.
albero davanti. Se sei incinta, dovresti assumere Famotidine ratiopharm 40 mg solo se sei incinta
Il medico curante ritiene che i benefici per te siano maggiori dei possibili rischi per il nascituro.

lattazione

Famotidina, il principio attivo di Famotidin-ratiopharm® 40 mg, viene escreto nel latte materno. Per questo
Gli effetti dell'assorbimento della famotidina da parte del bambino sono sconosciuti e disturbi dell'acido gastrico
l'istruzione non può essere esclusa, non si deve allattare durante il trattamento. Se necessario, deve
Famotidin-ratiopharm® 40 mg può essere sospeso dopo aver consultato il medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Se manifesta effetti collaterali come vertigini o mal di testa durante l'assunzione di famotidina
notare ratiopharm® 40 mg, non guidare o usare macchinari.

3 . Come prendere Famotidine ratiopharm 40 mg

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Chiedi al tuo medico o
Farmacista se non si è sicuri.

La dose raccomandata è

Ulcere duodenali acute e ulcere gastriche benigne

La dose giornaliera raccomandata è di 1 compressa rivestita con film Famotidin-ratiopharm® 40 mg (equivalente a 40 mg famotidina) su
Serata.

Pagina 2

sindrome di Zollinger-Ellison

Il trattamento deve essere usato in pazienti che non sono stati precedentemente trattati con farmaci anti-secrezione
con ½ compressa rivestita con film Famotidin-ratiopharm® 40 mg (equivalente a 20 mg famotidina) ogni 6 ore.

Il dosaggio dipende dall'entità della secrezione di acido gastrico e dalla risposta clinica
del paziente. Dosi giornaliere fino a 800 mg di famotidina sono state usate per un massimo di un anno senza
aumento degli effetti collaterali o perdita di efficacia. Con un altro antagonista di H₂

I pazienti trattati possono passare immediatamente a uno superiore a quello raccomandato per i nuovi assunti il quadro clinico e la dose del precedente farmaco sono stati presi l'ultima volta prima del cambiamento.

Dosaggio in pazienti con insufficienza renale

La famotidina viene escreta principalmente attraverso i reni. Ecco perché nei pazienti con ridotta

Riduzione della funzionalità renale (clearance della creatinina inferiore a 30 ml / min o creatinina sierica superiore a 3,0 mg / 100 ml) la dose giornaliera di famotidina raccomandata al 50%.

Si raccomanda anche una riduzione della dose giornaliera di famotidina al 50% per i pazienti in dialisi.

Si rivolga al medico se ha l'impressione che gli effetti di Famotidin-ratiopharm® 40 mg è troppo forte o troppo debole.

Tipo di applicazione

Le compresse rivestite con film vengono prese con un po' di liquido (ad esempio un bicchiere d'acqua) e deglutite intere. Può essere assunto indipendentemente dai pasti.

Durata dell'applicazione

Ulcere duodenali acute e ulcere gastriche benigne

La durata del trattamento dovrebbe essere di 4-8 settimane. Tuttavia, può accorciarsi se endoscopico l'ulcera è guarita. Se le ulcere non sono endoscopiche dopo 4 settimane guarite, il trattamento deve essere continuato per altre 4 settimane.

sindrome di Zollinger-Ellison

La terapia deve continuare per tutto il tempo clinicamente necessario.

Si rivolga al medico o al farmacista se ha l'impressione che gli effetti della famotidina ratiopharm® 40 mg è troppo forte o troppo debole.

Se prende più famotidina Teva 40 mg di quanto deve

Gli effetti collaterali che sono stati osservati con sovradosaggi corrispondono a quelli che si verificano normalmente conosciuti per esperienza clinica.

Se si sospetta avvelenamento dopo aver assunto grandi quantità di compresse, è necessario immediatamente informare un medico.

Se dimentica di prendere Famotidin-ratiopharm® 40 mg

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

L'assunzione regolare di Famotidin-ratiopharm® 40 mg - secondo le raccomandazioni di dosaggio e

Istruzioni del medico: contribuisce in modo significativo al successo del trattamento.

Se dimentica di prendere un tablet, prenderlo alla prossima ora programmata

non più della quantità prescritta di compresse.

In caso di ulteriori domande sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4 Quali effetti collaterali sono possibili?

Come tutti i medicinali, questo medicinale può avere effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Le seguenti informazioni sulla frequenza vengono utilizzate per valutare gli effetti collaterali:

molto spesso più di 1 persona su 10

spesso Da 1 a 10 pazienti su 100

non comune da 1 a 10 utenti su 1.000

raramente Da 1 a 10 utenti su 10.000

molto raramente meno di 1 su 10.000 persone

Comune:

Mal di testa, vertigini, costipazione e / o diarrea.

Non comune:

Secchezza delle fauci, nausea, vomito, disturbi gastrointestinali, formazione di gas intestinali in eccesso,

Perdita di appetito, affaticamento, eruzione cutanea, prurito, orticaria, disturbi del gusto.

raro:

Aumento dei valori di laboratorio (transaminasi, gamma-GT, fosfatasi alcalina, bilirubina), ittero, eccessivo

reazioni di sensibilità (reazione allergica, ritenzione di liquidi nel tessuto (edema), convulsivo

Restringimento dei bronchi), dolori articolari, ingrossamento del seno negli uomini.

Molto raro:

Infiammazione del fegato, disturbi mentali reversibili (come allucinazioni, disorientamento, confusione, ansia

e irrequietezza, depressione), impotenza, diminuzione della libido, tensione al seno, senso di oppressione al petto,

Crampi muscolari, disagio, sonnolenza, insonnia, convulsioni epilettiche (grand mal), perdita di capelli,

Trombocitopenia, leucopenia, agranulocitosi, neutropenia e pancitopenia (riduzione di tutto o solo

alcune cellule del sangue), gravi reazioni cutanee (sindrome di Stevens-Johnson / necrolisi epidermica tossica),

Disturbi della conduzione nel cuore (blocco AV) con recettore dell'istamina H₂ somministrato per via endovenosa

Antagonisti, polmonite.

contromisure

Se si verificano gli effetti collaterali di cui sopra o altri sintomi insoliti,

Chiedere consiglio al medico. Più dettagliata è la storia medica descritta dal medico e più più precisamente rimane informato sull'andamento del trattamento, meno probabile è una compromissione il successo del trattamento a causa di effetti collaterali indesiderati.

Segnalazione di effetti collaterali

In caso di effetti collaterali, si rivolga al medico o al farmacista. Questo vale anche per il secondario effetti che non sono specificati in questo foglio. Puoi anche segnalare effetti collaterali direttamente a quello Federal Institute for Drugs and Medical Devices, Dept. Pharmacovigilance, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, sito web: www.bfarm.de show. Puoi farlo segnalando gli effetti collaterali contribuire a fornire ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5 . Come conservare Famotidine ratiopharm 40 mg

Tenere questo medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Puoi prendere questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul cartone e sui blister non usare più. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese specificato.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 ° C.

6 . Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Famotidin-ratiopharm® 40 mg

Il principio attivo è famotidina.

Ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di famotidina.

Gli altri ingredienti sono:

Cellulosa microcristallina, povidone, amido pre-gelatinizzato, talco, magnesio stearato (Ph.Eur.), Ipromellosa, Macrogol 6000, biossido di titanio.

Descrizione dell'aspetto di Famotidina Teva 40 mg e contenuto della confezione

Compressa bianca, rotonda, rivestita con film con una tacca su un lato.

Famotidin-ratiopharm® 40 mg è disponibile in confezioni da 20, 50 e 100 compresse rivestite con film.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ~~cofabbricante~~

ratiopharm GmbH

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

Ludwig Merckle-Str. 3

89079 Ulm

89143 Blaubeuren

Questo opuscolo è stato rivisto l'ultima volta a luglio 2018.

Codice versione: Z09

H53858.07-Z09