


(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)
Scheda informativa sul farmaco ("Kusuri-no-Shiori")

Publicato: 11/2014

<p>Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle approvazioni concesse dall'autorità di regolamentazione giapponese. I dettagli dell'approvazione possono variare in base al Paese. I medicinali hanno reazioni avverse (rischi) così come efficacia (benefici). È importante ridurre al minimo le reazioni avverse e massimizzare l'efficacia. Per ottenere una migliore risposta terapeutica, i pazienti dovrebbero comprendere i farmaci che assumono e collaborare al trattamento.</p>	
<p>Nome commerciale : GLANATEC soluzione oftalmica 0,4% Principio attivo: Ripasudil cloridrato idrato Forma dosaggio : soluzione oftalmica limpida da incolore a giallo pallido, (flacone) limpida incolore, (tappo) verde intenso Stampa sulla confezione:</p>	
<p>Effetti di questo medicinale</p> <p>Questo medicinale inibisce la Rho chinasi e favorisce il drenaggio dell'umore acqueo dal deflusso principale. Di conseguenza diminuisce la pressione intraoculare.</p> <p>Di solito è usato per trattare il glaucoma e l'ipertensione oculare quando altri medicinali per il glaucoma hanno un effetto sufficiente o non possono essere utilizzati.</p>	
<p>Prima di usare questo medicinale, assicurati di informare il medico o il farmacista</p> <ul style="list-style-type: none">• Se in precedenza ha avuto reazioni allergiche (prurito, eruzione cutanea, ecc.) a qualsiasi medicinale.• Se sei incinta o stai allattando.• Se stai assumendo altri medicinali. (Alcuni medicinali possono interagire per migliorare o diminuire i medicinali effetti. Fare attenzione ai medicinali da banco, agli integratori alimentari e ad altri medicinali soggetti a prescrizione.)	
<p>Schema di dosaggio (Come prendere questo medicinale)</p> <ul style="list-style-type: none">• Il programma di dosaggio prescritto dal medico è << In generale, essere scritto da un operatore sanitario >> applicare 1 goccia all'volta, due volte al giorno. Seguire rigorosamente le istruzioni.• Applicare il medicinale in modo da non toccare l'occhio direttamente con la punta del contagocce.• Se è necessario utilizzare altri colliri contemporaneamente, attendere più di 5 minuti.• Evitare di applicare il medicinale quando è indosso lenti a contatto morbide.• Se si dimentica una dose, applicare la dose dimenticata il prima possibile. Tuttavia, se è quasi l'ora della dose successiva salti la dose dimenticata e continui il normale programma di dosaggio. Non dovresti mai applicare due dosi contemporaneamente.• Se si applica accidentalmente una dose superiore a quella prescritta consultare il medico o il farmacista.• Non smetta di applicare questo medicinale a meno che il medico non te lo dica di farlo.	
<p>Precauzioni durante l'assunzione di questo medicinale</p>	
<p>Possibili reazioni avverse a questo medicinale</p> <p>Le reazioni avverse più comunemente riportate comprendono congestione congiuntivale, infiammazione congiuntivale, blefarite e irritazione oculare. Se si verifica uno qualsiasi di questi sintomi, consultare il medico o il farmacista.</p> <p>I sintomi descritti di seguito sono raramente riscontrati come sintomi iniziali delle reazioni avverse indicate tra parentesi. Se si verifica uno qualsiasi di questi sintomi interrompa l'assunzione di questo medicinale e consulti immediatamente il medico.</p> <p>Nessuna voce pertinente.</p> <p>I sintomi di cui sopra non descrivono tutte le reazioni avverse a questo medicinale. Consulta il tuo medico o il farmacista se noti sintomi preoccupanti diversi da quelli sopra elencati.</p>	
<p>Condizioni di conservazione e altre informazioni • Tenere</p> <p>fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano dalla luce solare diretta, dal calore e dall'umidità.</p> <ul style="list-style-type: none">• Scartare il resto Non conservarli.	
<p>Solo per uso professionale sanitario / /</p>	

Per ulteriori informazioni si rivolga al medico o al farmacista.