

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale - per l'uso interno della Farmacia)

Opuscolo informativo per il paziente

Compresse Hiprexda 1 g

Metenammina ippurato

Legga attentamente questo foglio prima di iniziare a prendere questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo.
- Se ha ulteriori domande, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto solo per lei. Non lo dia ad altri. Potrebbe danneggiarli, anche se i loro segni di malattia sono gli stessi dei tuoi.
- Se si manifestano qualsiasi degli effetti collaterali si rivolga al medico o al farmacista. Ciò include qualsiasi possibile effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo. Vede la sezione 4.

Cosa c'è in questo foglio illustrativo:

1. Che cos'è Hiprex e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Hiprex
3. Come prendere Hiprex
4. Possibili effetti collaterali
5. Come conservare Hiprex
6. Contenuto della confezione e altre informazioni.

1. Che cos'è Hiprex e a cosa serve

Hiprex contiene il principio attivo metenammina ippurato e appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antibatterici. Questi funzionano uccidendo molti tipi diversi di batteri che causano infezioni. Hiprex è usato per trattare le infezioni del tratto urinario e impedirne la ricomparsa. Il tratto urinario è un nome collettivo per le parti del corpo che producono, immagazzinano e trasportano l'urina. Questi includono il rene, la vescica e i tubi chiamati uretere e uretra. Viene utilizzato anche per evitare infezioni del tratto urinario nei pazienti con cateteri vescicali (un tubo che aiuta con l'incontinenza) e nelle persone sottoposte a determinate procedure mediche.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Hiprex

Non utilizzare Hiprex se:

- È allergico alla metenammina ippurato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati nella sezione 6)
- Stai assumendo medicinali antibiotici chiamati sulfamidici. Questi possono danneggiare i tuoi reni quando preso contemporaneamente all'Hiprex
- Sei gravemente disidratato
- Ha seri problemi ai reni
- Hai problemi al fegato
- Hai la gotta
- Hai una condizione chiamata acidosi metabolica (uno squilibrio chimico nel sangue).

Se rientri in una delle condizioni sopra descritte, si rivolga al medico o al farmacista.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Hiprex se:

- Ha qualsiasi tipo di problema ai reni.

Informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- Medicinali per rendere le urine meno acide come citrati di potassio e acetolamide.

Questi possono impedire a Hiprex di funzionare correttamente.

- Qualsiasi altro medicinale, compresi quelli ottenuti senza prescrizione medica.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso gravidanza, se sospetta sta pianificando una gravidanza, se allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Hiprex

Prenda sempre Hiprex esattamente come le ha detto il medico o il farmacista. Dovresti consultare il medico o il farmacista se non sei sicuro.

Importante: il

medico sceglierà la dose adatta a te. La dose sarà indicata chiaramente sull'etichetta che il farmacista mette sul medicinale. In caso contrario, o se non è sicuro, chiedi al medico o al farmacista.

Adulti

La dose raccomandata è una compressa due volte al giorno.

Se ha un catetere, il medico può aumentare la dose a una compressa tre volte al giorno.

Uso nei bambini

Non adatto a bambini di età inferiore a 6 anni.

Bambini di età compresa tra 6 e 12 anni la dose raccomandata è mezza compressa (500mg) due volte al giorno.

Modo di somministrazione

Le compresse possono essere divise a metà. Se risulta particolarmente difficile deglutirle, le compresse possono essere frantumate e assunte con una bevanda a base di latte o succo di frutta.

Se prende più Hiprex di quanto deve

Se accidentalmente prende più Hiprex di quanto deve potrebbe vomitare o vedere sangue nelle urine.

Bevi molta acqua e vai immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale più vicino o dal tuo medico.

Il medico potrebbe prescriverti un altro medicinale per evitare che i sintomi peggiorino.

Se dimentichi di prendere Hiprex

Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata. Prenda semplicemente la dose successiva come previsto.

Se interrompe il trattamento con

Hiprex il medico le dirà per quanto tempo dovrà assumere il medicinale. Non smetta di prendere Hiprex senza prima parlare con il medico.

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti collaterali

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Potresti riscontrare quanto segue:

Non comuni: possono interessare fino a 1 persona su 100 •

Eruzioni

cutanee •

Prurito • Irritazione dello

stomaco • Irritazione della vescica solitamente osservata come sensazioni di bruciore ed dolore durante la minzione

• Nausea • Vomito

Non noto (non può essere stimato sulla base dei dati disponibili)

- Diarrea, dolore addominale

Segnalazione degli effetti

collaterali Se manifesta qualsiasi effetto collaterale, si rivolga al medico, al farmacista all'infermiere. Ciò include qualsiasi possibile effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo. Puoi anche segnalare gli effetti collaterali direttamente tramite lo Yellow Card Scheme all'indirizzo: www.mhra.gov.uk/whitecard cercare MHRA Yellow Card su Google Play o sull'Apple AppStore.

Segnalando gli effetti indesiderati puoi contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Hiprex

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non utilizzare Hiprex dopo la data di scadenza riportata sul flacone. La data di scadenza riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare Hiprex a temperatura inferiore a 30°C, il coperchio del flacone chiuso nella sua scatola originale.

I medicinali non devono essere smaltiti tramite le acque reflue o i rifiuti domestici. Restituisci al farmacista tutti i medicinali di cui non hai più bisogno.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Hiprex Il

principio attivo è metenamina ippurato. Ogni compressa contiene 1 grammo.

Gli altri componenti sono magnesio stearato (E572) povidone e silice colloidale anidra.

Descrizione dell'aspetto di

Hiprex Una compressa di forma oblunga di colore da bianca a bianco crema, codificata HX, con linee di incisione su un lato e linee di incisione sull'altro lato con una lunghezza di 3M. Hiprex è disponibile in una bottiglia di vetro che contiene 60 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione

in commercio: Mylan Products Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Regno Unito.

Produttore: Meda

Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1, 61352 Homburg, Germania

SIDEFARMA - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, SA

Rua da Guiné nº 26, 2689-514 Prior Velho, Portogallo

Questo foglio illustrativo è stato rivisto l'ultima volta nel gennaio 2023

Se questo foglio illustrativo è difficile da vedere o leggere e lo desideri in un formato diverso, contatta Mylan Products Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Regno Unito.