

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

Cosa c'è in questo opuscolo

1. Che cos'è Maprotilin-neuraxpharm ea cosa serve applicato?
2. Cosa dovresti sapere prima di assumere Maprotiline
Presta attenzione a Neuraxpharm?
3. Come prendere Maprotilin-neuraxpharm
4. Quali effetti collaterali sono possibili?
Come conservare Maprotilin-neuraxpharm

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Maprotilin-neuraxpharm ea cosa serve è usato?

Maprotilin-neuraxpharm è un medicinale per
Trattamento di disturbi patologici
(Depressione) e appartiene a un gruppo di
Medicinali usati come antidepressivi tetraciclici
essere designato

Maprotilin-neuraxpharm è usato per
disturbi depressivi.

2. Cosa dovresti sapere prima di assumere Maprotiline
Presta attenzione a Neuraxpharm?

Maprotilin neuraxpharm non deve essere assunto
sui uomini

- se è allergico (ad es. Allergico
sotto forma di eruzioni cutanee o respiratorie
reclami) contro la maprotilina cloridrato,
sostanze attive correlate (tri e tetraciclici
Antidepressivi) o una delle condizioni elencate nella sezione 6.
altri ingredienti di questo medicinale
i mezzi sono.

- per avvelenamento acuto con alcool o con un medico
farmaci che smorzano il sistema nervoso centrale
fen (sonniferi, alcuni antidolorifici e
Farmaci psicotropi).

- nel delirio acuto (confusione ed eccitazione
condizioni con delusioni e z. T.
gravi disturbi fisici) e mania
(forte stato di eccitazione con patologico
Elation).

- con aumento della pressione intraoculare non trattata
(Glaucoma ad angolo stretto).

- con comportamento urinario acuto.

- con grave disfunzione epatica o renale
gene.

- Con convulsioni che non sono in terapia può essere trattato con successo.
- con allargamento della prostata con residuo formazione di urina.
- se l'uscita dello stomaco è ridotta (pilorica naso).
- in caso di paralisi dell'intestino (ileo paralitico).
- in caso di gravi disturbi non trattati regolazione della pressione arteriosa.
- nella fase acuta di un infarto.
- con disturbi di conduzione esistenti del cuore.
- per esistenti o meno di due settimane terapia precedente con alcuni medici farmaci per la depressione (inibitore MAO tessuti).

Bambini e adolescenti sono in trattamento con Maprotilin-neuraxpharm.

La maprotilina viene escreta nel latte materno ed è consentita pertanto non deve essere usato durante l'allattamento.

È un trattamento con Maprotilin-neuraxpharm inevitabile, deve essere svezzato (vedi anche Sezione gravidanza e allattamento).

Avvertenze e precauzioni

Di seguito viene descritto quando è possibile utilizzare Maprotilin-neuraxpharm solo a determinate condizioni e prenderlo solo con particolare attenzione permesso a. Si prega di chiedere al proprio medico di questo. Questo vale anche se queste informazioni ti arrivano prima applicare una volta.

Maprotilin-neuraxpharm può essere preso in considerazione solo prendendo tutte le precauzioni necessarie essere applicato a

- Disfunzione epatica e renale.
- ingrossamento della ghiandola prostatica senza residui formazione di urina.
- Disturbi della formazione del sangue.
- epilessia e aumento del sequestro del Cervello (ad es. Danno cerebrale di varie cause che, alcolismo).
- debolezza cardiovascolare esistente.
- Malattie metaboliche come B. tiroide ipertiroidismo, diabete mellito.

Pensieri suicidi e peggioramento della depressione

Sion:

A volte quando sei depresso puoi farlo

Pensa di farti del male
o suicidarsi. Tali pensieri possono
la prima volta che usi l'antidepressivo
siva essere rafforzato perché tutte queste medicine
impiegare del tempo per lavorare, di solito
circa due settimane, a volte più a lungo.
È probabile che si verificano tali pensieri.

Licher,

- se ci hai pensato prima
hanno dovuto togliersi la vita o farlo
pensato di farsi del male

- se sei un giovane adulto. Risultato
Gli studi clinici sono aumentati
rischio di comportamento suicidario
nei giovani fino a 25 anni
ha mostrato chi soffriva di uno psichiatrico
Kung ha sofferto e con un antidepressivo
sono stati trattati.

Vai dal tuo medico o cerca
vai subito in ospedale se hai
ci ho pensato in qualsiasi momento
agitare, ferire se stessi o la vita
prendere.

Può essere utile se sei un amico
o dire ai parenti che siete depressi
siamo. Chiedi a queste persone questi pacchetti
Leggi il supplemento. Sfidali per aiutarti
condividere se ne hanno l'impressione
La tua depressione peggiora o se lo fa
preoccuparsi di cambiamenti comportamentali in te
fare.

Cosa bisogna considerare nelle persone anziane?

Anche nei pazienti anziani o debilitati
Pazienti con cambiamenti organici del cervello,
Debolezza circolatoria e respiratoria (ostruttiva cronica
insufficienza respiratoria) e meno

Si deve usare cautela con la funzionalità renale o epatica
(Rispettare le istruzioni di dosaggio!).

Quali misure precauzionali devono essere osservate
volere?

Nel trattamento di pazienti gravemente depressi
fondamentalmente prendere in considerazione tale rischio
un suicidio appartiene al quadro clinico e
nonostante il trattamento fino alla scomparsa della malattia
i sintomi persistono. La guida
effetti irritanti della lattina di maprotilin cloridrato

si verificano prima dell'effetto lifting dell'umore.

Se mai ne hai voglia

La tua vita non valeva più la pena di essere vissuta, dovresti

Consultare immediatamente un medico.

Secondo il rispettivo rischio (aspetto

probabilità di effetti collaterali e rischio

posizione del paziente) sono ad intervalli regolari

controlli di pressione sanguigna, ECG, emocromo, fegato

funzione e, se necessario, EEG.

Se si verifica un umore maniacale

Maprotilin neuraxpharm deve essere immediatamente sospeso.

Zen. Lo stesso vale per il verificarsi di un prodotto acuto

sintomi nel trattamento della depressione

Sindromi nel corso di malattie schizofreniche.

La maprotilina cloridrato può ridurre la soglia convulsiva

più in basso, quindi con un aumento delle crisi

Disponibilità (ad es. Sindrome da astinenza dopo un improvviso

Ritiro di benzodiazepine o barbiturici)

le convulsioni stanno aumentando.

Con una ghiandola tiroidea iperattiva

Effetti collaterali di Maprotilin-neuraxpharm

il sistema cardiovascolare si rafforza.

I diabetici devono controllare i livelli di zucchero nel sangue durante

e dopo il trattamento con Maprotilin neurax

Monitorare il farmaco attentamente.

Maprotilin-neuraxpharm può causare secchezza delle fauci

causare ciò che aumenta il rischio di carie. Durante uno

Pertanto, il trattamento a lungo termine deve essere somministrato regolarmente

I denti sono controllati.

Se indossi lenti a contatto e irritazione agli occhi

informi il medico.

Maprotilin -

neuraxpharm ®

25 mg

Compresse rivestite con film

Per l'uso negli adulti

Ingrediente attivo: maprotiline hydrochloride

Condividi prima di qualsiasi intervento chirurgico o

responsabile dell'inizio del trattamento dentale

medico o dentista verbale che stai usando Mapro

Prendi Tilin-Neuraxpharm.

Maprotilin-neuraxpharm può causare

La tua pelle è più sensibile alla luce solare.

Anche una breve esposizione al sole può

Eruzione cutanea, prurito, arrossamento della pelle o della pelle causare scolorimento. Non sederti direttamente

Esposizione al sole, indossare un solare occhiali e proteggersi con gli opportuni

Vestito.

Assunzione di Maprotilin-neuraxpharm insieme altre medicine

Informi il medico o il farmacista se

Stai prendendo altre medicine

recentemente assunto altre medicine

ha usato o intende usare altri medicinali

prendere / usare mezzi.

Gli effetti dell'alcol e gli effetti

altri farmaci depressivi centrali

(ad es. barbiturici, benzodiazepine, sistemiche

Anestetici) possono essere assunti durante l'assunzione di Maprotilin-neuraxpharm.

Con ipertiroidismo e pazienti,

ricevere i preparati tiroidei, cardio-

aumento degli effetti collaterali vascolari.

Con somministrazione simultanea di altri farmaci

medio, alcuni come Maprotilin-neuraxpharm

atto (effetto anticolinergico, ad es. atropina, bipe-

cavalcato), con rinforzo periferico e centrale

effetti centrali (in particolare delirio [spiegazione

vedi sotto "Maprotilin-neuraxpharm non deve essere preso "]).

L'effetto di alcune medicine che

Sistema nervoso organo interessato (adrenergico

Effetti sul sistema nervoso autonomo

da ammine simpaticomimetiche ad es. B. Adrenalina

lin, noradrenalina, isoprenalina, efedrina, fenile

ephrin, nonché gocce per il naso e vasocostrittore

Additivi per anestetici locali), possono essere

somministrazione precoce di Maprotilin-neuraxpharm

essere rafforzato.

Alcuni medicinali utilizzati anche per il trattamento

di depressione (MAO-

Inibitori), in ogni caso almeno 14 giorni

prima del trattamento con Maprotilin-neuraxpharm

essere abbandonato; essere sospeso; essere dedotto; essere licenziato. Altrimenti deve essere

effetti collaterali come agitazione, tremore, delirio,

Coma, febbre alta, convulsioni e gravi

Si possono prevedere fluttuazioni della pressione sanguigna. Questo

vale anche per la somministrazione di un inibitore MAO

dopo il trattamento con Map-

rotilin-neuraxpharm.

Assunzione di altro antide-

pressiva, come ad esempio B. fluvoxamina o fluoxetina (il cosiddetto

chiamato reuptake selettivo della serotonina

Inibitori), le concentrazioni plasmatiche

di maprotilin hydrochloride si alzano bruscamente. Per colpa di

l'escrezione molto lenta di queste sostanze

l'effetto può durare corrispondentemente a lungo.

Può indebolire l'effetto di

alcuni farmaci per l'ipertensione (antiipertensivi

siva di guanethidine, bethanidine, cloni-

din, reserpine e alpha-methyldopa)

il rischio di aumento della pressione sanguigna

(Ipertensione di rimbalzo) in pazienti con clonidina

pazienti delten.

Maprotilin-neuraxpharm può ridurre l'efficacia di

Medicinali per regolare il battito cardiaco

(Antiarritmici, in particolare di tipo IA [ad es.

Chinidina] e tipo III [ad es. B. Amiodarone]).

Maprotilin-neuraxpharm può modificare l'intervallo QTc in

Estendi ECG. Pertanto, non dovrebbe essere allo stesso tempo

con altri farmaci che hanno anche QTc

È possibile applicare l'intervallo di estensione

perché ciò aumenta il rischio di aritmia (irregolare

battito cardiaco moderato) può essere aumentato.

In combinazione con neurolettici (agenti per

Trattamento di alcuni disturbi mentali ed emotivi

gen) può tri- e aumentare i livelli ematici

antidepressivi tetraciclici come la maprotilina idro-

vieni cloruro. In combinazione con thio

la ridazina può causare un battito cardiaco irregolare grave

si verificano.

Con trattamento simultaneo con fenotiazina hal

agenti e brusca riduzione della dose

di benzodiazepine deve essere aumentato

Equo rischio di convulsioni

essere netto.

Anche con trattamenti esistenti

con cimetidina (medicinale contro le ulcere allo stomaco)

può il livello ematico di maprotilin hydrochloride

aumentare.

Il metilfenidato può portare ad un aumento del plasma

concentrazioni e un maggiore effetto di

Piombo maprotilina cloridrato.

Medicinali che influenzano il sistema monoossigenasi

attivare il fegato (ad es. barbiturici, fenitoina,

Carbamazepina, contraccettivi orali), lattina

Abbassare i livelli ematici di maprotilin hydrochloride.

Somministrazione simultanea di maprotilin hydrochloride e

La fenitoina o la carbamazepina possono portare ad un aumento concentrazione plasmatica di anticonvulsivanti (medi-
anatra che colpisce la soglia convulsiva)
condurre.

La maprotilina cloridrato può guastarsi

Sostanze cumariniche (anticoagulanti) ritardate
piace e rafforza il loro effetto. Il pro

Il contenuto di trombina nel plasma deve quindi essere attentamente
essere monitorato.

In combinazione con insulina o sulfonilurea

fen (anti-diabetici) può aumentare i loro effetti

volere. Nei diabetici, quindi, è l'inizio e

alla fine della terapia con Maprotilin-new

raxpharm per monitorare i livelli di zucchero nel sangue.

Assunzione di Maprotilin-neuraxpharm insieme

uomini con alcol

Gli effetti dell'alcool possono essere ridotti contemporaneamente

L'uso di Maprotilin-neuraxpharm si è intensificato

volere. Pertanto, durante il trattamento

Evita l'alcool con Maprotilin-neuraxpharm.

periodo di gravidanza e allattamento

In caso di gravidanza o allattamento o se

Pensi di poter essere incinta o stai pianificando di farlo

per rimanere incinta, chiedi prima del

Il tuo medico o

Farmacista per un consiglio

gravidanza

Durante la gravidanza, la maprotilina

neuraxpharm solo su prescrizione espressa

essere preso dal medico perché nessuno

esistono esperienze sufficienti. Will Map-

rotilin-neuraxpharm durante la gravidanza

la terapia deve essere impostata 7 settimane prima

data di nascita calcolata gradualmente terminata

per prevenire i sintomi di svezzamento (ad es.

lealtà, letargia, contrazioni) nel neonato

evitare.

lattazione

La maprotilina viene escreta nel latte materno ed è consentita

pertanto non deve essere usato durante l'allattamento.

È un trattamento con Maprotilin-neuraxpharm

inevitabile, deve essere svezzato.

Guida e utilizzo

macchine

Attraverso individualmente che si verificano diversi

Reazioni (ad es. Stanchezza, ridotta
attenzione) la capacità di attivamente

sulla strada o per il funzionamento

essere influenzato dalle macchine. questo si applica

in misura maggiore all'inizio del trattamento e

Cambio di preparazione e collaborazione

con altre droghe ad azione centrale

(Antidolorifici, sonniferi, droghe psicotrope).

Potresti quindi essere inaspettato

e gli eventi improvvisi non sono più rapidamente e

reagire in modo sufficientemente specifico. In questo caso, guidare

non auto o altri veicoli. Operare

niente utensili elettrici e macchine!

Non lavorare senza una presa sicura! Nota

In particolare, l'alcol è la tua capacità di guidare

peggiorato ancora di più!

Questo medicinale contiene lattosio

Si prega di prendere Maprotilin-neuraxpharm

solo dopo aver consultato il medico se

Sei consapevole di essere sotto un

sensibilità a determinati zuccheri.

3. Come prendere Maprotilin-neuraxpharm

Prenda sempre questo medicinale con attenzione

dopo aver consultato il medico. Chiedi a

Consulta il tuo medico o farmacista se lo sei

non sono sicuro.

Se non diversamente prescritto dal medico, lo è

dose abituale:

Il dosaggio e la durata dell'uso devono essere i

situazione di reazione individuale, l'applicazione

offre e adattato alla gravità della malattia

volere.

Si applica qui che se il

I pazienti hanno mantenuto la dose il più piccola possibile

dovrebbe essere quello d'altra parte però

in caso di mancata risposta del disponibile

intervallo di dosaggio permanente può essere utilizzato

dovrebbero.

Leggi l'intero opuscolo

attentamente prima di prenderlo

di questa medicina perché loro

contiene informazioni importanti.

• Conservare questo foglio illustrativo. Forse

ti piacerebbe rileggerlo più tardi?

- In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il medico o il farmacista.
- Questo medicinale le è stato somministrato personalmente ha scritto. Non lo dia ad altri. esso può danneggiare altre persone, anche se hanno gli stessi sintomi di te.
- Se noti effetti collaterali, contatta Il medico o il farmacista. questo si applica anche per gli effetti collaterali che non ci sono Sono specificati il foglio illustrativo. Per favore, riferisci

Sezione 4

Istruzioni per l'uso:
informazioni per
utente

elec

tro

nicchia

e V

ersio

n

Quanto spesso e in quale quantità dovresti usare Maprotiline

Stai prendendo Neuraxpharm?

Il trattamento preliminare è graduale

Aumento della dose e interruzione del trattamento

riducendo lentamente la dose

prendere.

Mentre l'effetto calmante è di solito

telbar nei primi giorni, la stimolazione

effetto schiarente alla mente di solito dopo 1-3

Settimane attese.

Per il trattamento ambulatoriale delle malattie depressive

La dose iniziale è da 1 a 3 volte

1 compressa rivestita con film Maprotilin-neuraxpharm (corrispondente a 25-75 mg di maprotilina cloridrato / giorno)

puledro. La dose giornaliera può essere utilizzata anche come dose serale

È possibile somministrare una singola dose.

La dose può variare a seconda dell'efficacia e

Tollerabilità, dopo 2 settimane da 1 altro

Compressa rivestita con film Maprotilin-neuraxpharm (corrispondente 25 mg di maprotilina cloridrato / giorno) aumentati

e gradualmente da 2 a 3 volte 2 compresse rivestite con film

Maprotilin neuraxpharm (corrispondente a un massimo di 150

mg di maprotilina cloridrato / giorno) fino al

l'ingresso può essere aumentato. Se applicabile, è attivo
Forme di dosaggio con un principio attivo più elevato
contenuto da schivare.

La dose massima giornaliera per i pazienti ambulatoriali
dieci sono 6 compresse rivestite con film di Maprotilin-neuraxpharm
(corrispondente a 150 mg di maprotilina cloridrato), a
pazienti ricoverati fino a 225 mg di maprotilin hydro-
cloruro, essendo in forme di dosaggio con a
è possibile utilizzare un contenuto di ingrediente attivo più elevato
dovrebbero.

Dopo la depressione della sindrome depressiva
la dose deve essere gradualmente ridotta a una
dose giornaliera di mantenimento di 1 - 2 compresse rivestite con film
Maprotilin neuraxpharm (equivalente a 25-50 mg
Maprotilin hydrochloride).

Nota

I pazienti più anziani hanno spesso bisogno di un livello significativamente più basso
dose più bassa e spesso mostrano la metà
la solita dose giornaliera soddisfacente
Effetto del trattamento.

Come e quando usare Maprotilin neurax
prendere il farmaco?

L'assunzione avviene presso o indipendentemente dal
Pasti senza masticare con sufficiente liquido
(ad esempio un bicchiere d'acqua).

Durata dell'applicazione

Il medico deve consigliare sulla durata del trattamento
decidere individualmente. Di solito devi farlo
Prendi Maprotilin-neuraxpharm per alcune settimane,
prima che ti senti meglio. La durata media
un periodo di trattamento fino al

I sintomi in generale sono
almeno 4 - 6 settimane.

In caso di depressione endogena,
trattamento dei sintomi depressivi
possibilmente con un ridotto (ambulatoriale)

La dose è continuata per 4-6 mesi.

Per favore, parli con il medico o la farmacia
se hai l'impressione che il
Maprotilin neuraxpharm troppo forte o troppo
è debole.

Se usi più Maprotiline
ho preso Neuraxpharm di te
dovrebbero:

Maprotilin neuraxpharm può essere un avvelenamento pericoloso
causare sintomi anche quando è presente

si applicano grandi quantità. Bambini e I bambini piccoli sono particolarmente a rischio. Quanto segue, a volte pericoloso per la vita, All'interno si possono verificare sintomi di avvelenamento si verificano entro poche ore: confusione, eccitazione condizioni (irrequietezza, agitazione), convulsioni, Appannamento della coscienza fino al punto di incoscienza disturbo muscolare (atassia, muscolo rigida, coreoatetosi, aumento dei riflessi), bassa bassa pressione sanguigna, shock, grave cardiovascolare Disturbi (accelerazione del battito cardiaco, Battito cardiaco irregolare, insufficienza cardiaca, molto rari casi di arresto cardiaco), respiro corto fino al Arresto respiratorio, bluastro della pelle e del muco pelli (cianosi), riduzione della produzione di urina (Oliguria, anuria), vomito, febbre, sudorazione, pupille dilatate (midriasi).

Fammi sapere quando vedi Filmta ho preso bletten, così come con uno Sospettare immediatamente di avvelenare un medico / Medico di emergenza o cerca nel pronto soccorso del ospedale più vicino! L'intenso il trattamento medico è il più rapido possibile iniziato!

Misure mediche in caso di sovradosaggio Entro la prima ora di prenderlo un lavaggio gastrico promettente, seguito da la somministrazione ripetuta di carbone medicinale. L'emodialisi e l'emoperfusione sono solo interne indicato mezz'ora dopo l'ingestione e anche allora di valore incerto. Alcalinizzazione di Plasma con sodio idrogeno carbonato o sodio umlactate è stato anche usato nel trattamento del cuore complicazioni ben comprovate.

La fisostigmina può presentare vari avvelenamenti centrali Rompere i sintomi in modo rapido e sicuro.

Anche con avvelenamento con ritmo tachicardico i disturbi sono adatti alla fisostigmina.

Un esame tossicologico clinico del sangue o plasma, urina e prima lavanda gastrica è raccomandato.

Se interrompe il trattamento con Maprotilin-new dimenticato raxpharm

Non prenda una dose doppia per prenderlo ha dimenticato la dose precedente.

Se mai prende una dose di Mapro-

dimenticato di prendere Tilin-Neuraxpharm
questo non appena ci pensi. Quindi guidi
ha continuato a prendere il farmaco alla solita ora
prendere. Tuttavia, presto sarà tempo di prenderlo
alla dose successiva, prenda quella dimenticata
Dose no, ma guida con il solito
schema continuato. Se hai qualche domanda
contattare il medico.

Se interrompe il trattamento con Maprotilin-new
Annulla raxpharm

Assicurati di parlare con il tuo medico prima
Tu - ad es. B. a causa del verificarsi di effetti collaterali
kungen: trattamento arbitrario con mappa
interrompere la rotilina-neuraxpharm o prematuramente
rottura. Altrimenti metti in pericolo la terapia
successo.

Una possibile conclusione del trattamento è
riducendo lentamente la dose
uomini.

Se hai ulteriori domande su come prendere questo
Medicina, contattare il medico
o farmacista.

4. Quali effetti collaterali sono possibili?

Come tutti i medicinali, questo medicinale
effetti collaterali moderati, ma non con
deve capitare a tutti.

possibili effetti collaterali

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10)
preoccupazione)

Soprattutto all'inizio del trattamento:

- sonnolenza, stanchezza, irrequietezza ed eccitazione
condizioni
- vertigini, mal di testa, lieve tremore
(Tremore), mioclono (singolare contrazione a scatti)
muscoli), vertigini

- Visione offuscata (disturbi della sistemazione
candelieri)

- Secchezza delle fauci, costipazione

- Minzione difficile o comportamento delle urine
Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)
influenzare)

- aumento di peso

- aggressività, incubi, paura, aumento dell'appetito
problemi di memoria e concentrazione,
Ipomania e mania (condizioni più facili da fare
grave eccitazione), insonnia o insonnia

posizioni, rafforzamento della malattia depressiva
segni, eccessivo comportamento calmo durante il giorno
(Sedazione diurna), disturbi sessuali (libido e
Disfunzione erettile)

- Disturbi del linguaggio (disartria), parestesia
(Intorpidimento, formicolio), debolezza muscolare
- Tachicardia sinusale (battito cardiaco accelerato), palpitazioni
(palpitazioni scomode), cambiamenti
la curva della corrente cardiaca (variazioni di T e ST),
Svenimento, ipotensione ortostatica (pressione sanguigna
riduzione)
- Nausea, vomito, indigestione
- Sintomi allergici della pelle sotto forma di
Eruzioni cutanee e vesciche (es
loro, orticaria), a volte accompagnati da febbre,
Ipersensibilità cutanea (fotosensibilità
bilità), sanguinamento cutaneo con piccole macchie (petecchie),
aumento della sudorazione

• Vampate di calore
Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)
preoccupazione)

- delirio (grave confusione), allucinazioni (sensoriali
delusioni), nervosismo, stati di confusione
- Acatisia (irrequietezza di movimento), disturbi del
Movimento (atassia), convulsioni cerebrali
convulsioni (il rischio aumenta con dosi più elevate
l'attivazione di convulsioni cerebrali)
- Attacchi improvvisi di glaucoma (glaucoma)
- palpitazioni (aritmie cardiache), ipertensione
appeso, disturbi di conduzione del cuore
con cambiamenti nella curva della corrente cardiaca (QRS-
Ampliamento, blocco coscia, cambio PQ)
- diarrea
- Aumento dei valori della funzionalità epatica (transami-
fosfatasi alcalina, nasale)
- ritenzione idrica (edema)
- febbre da farmaci

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)
influenzare)

- abbassamento della pressione sanguigna

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000)
preoccupazione delten)

- Cambiamenti del quadro ematico (leucopenia, agranulo-
citosi, trombocitopenia, eosinofilia)
- ingrossamento della ghiandola mammaria (ginecomastia)
e flusso del latte (galattorrea), sindrome da

adeguata distribuzione dell'udito antidiuretico
mons (SIADH)

- attivazione di sintomi psicotici, depersonalizzazione

- discinesia (disturbo di alcune funzioni nervose muscoli), alterazioni EEG, coordinazione
disturbi della nazione

- acufene (ronzio nelle orecchie)

- Sensazione di naso chiuso

- Infiammazione allergica degli alveoli (alveolite allergica) con o senza moltiplicazione
alcuni globuli bianchi (eosinofili) e broncospasmo (crampi del bronchi)

- disturbi del gusto, stomatite (infiammazione mucosa orale), carie dentale

- Infiammazione del fegato (epatite) con e senza Ittero (ittero)

- Infiammazione vascolare (vasculite cutanea) e eritema multiforme, perdita di capelli fino a

Perdita di capelli, prurito, porpora (sanguinamento della pelle)
Molto raramente hanno usato

Ipoglicemia da maprotilin in pazienti con tipo 1
Diabete mellito, anche disturbi bronchiali
perseverazione visiva osservata.

Non nota (frequenza basata su

i dati disponibili non possono essere stimati)

Casi di pensieri e comportamenti suicidi

durante la terapia con maprotilin o breve

Dopo la fine del trattamento, i rapporti sono

(vedere la sezione "Avvertenze e Precauzioni").

Istruzioni speciali

Un'improvvisa interruzione di un massimo a lungo termine

trattamento dosato con Maprotilin-neuraxpharm

dovrebbe essere evitato in questo caso

di mal di testa, nausea, vomito, sonno

disturbi, paura, delirio (profonda confusione), allu

zinazioni (illusioni), ipomania e

Mania (stati di eccitazione da lieve a grave),

Dolore addominale, diarrea, nervosismo,

della depressione sottostante o

ricidiva di umore depressivo

è prevedibile.

Nei pazienti cardiaci e anziani,

specialmente durante un lungo dosaggio

terapia del tempo con Maprotilin-neuraxpharm, a
monitoraggio regolare della funzione cardiaca e
Eseguire i controlli ECG.

Pazienti con tendenza a abbassare la pressione sanguigna
Variazione della posizione corporea (ipotensi ortostatica
tonie) richiedono un monitoraggio regolare della pressione arteriosa
troll. Se, soprattutto quando ci si alza da una
posizione sdraiata o seduta, vertigini,
Possono verificarsi vertigini o svenimenti
essere un vantaggio se ti siedi lentamente.
Questo problema dura più a lungo o peggio
dovresti consultare il tuo dottore.

In pazienti con ipertiroidismo
può avere effetti indesiderati di maprotilina
neuraxpharm al cuore e al sistema vascolare
essere rafforzato (vedere anche la sezione "Entrate
da Maprotilin-neuraxpharm insieme ad altri
ren medicine").

In rari casi, attivato dalla mappa-
rotilina, a causa di disturbi nella maturazione delle cellule del sangue
(Leucopenia, agranulocitosi), simil-influenzale
Sintomi come febbre, gommata o
Infiammazione della bocca e mal di gola
si verificano. In questi casi, l'emocromo dovrebbe
essere trollato.

Le convulsioni sono state sottoposte a trattamento
Maprotilin hydrochloride in pazienti con e senza
Storia dell'epilessia osservata. Perciò
ha maggiori probabilità di avere convulsioni (epilessia,
cambiamenti organici del cervello), specialmente sotto
dosi più elevate di Maprotilin-neuraxpharm,
la somministrazione simultanea di anticonvulsivanti
considerare.

Segnalazione di effetti collaterali

Se noti effetti collaterali, contatta

Il medico o il farmacista. questo si applica
anche per gli effetti collaterali che non ci sono

Sono specificati il foglio illustrativo.

Puoi anche segnalare effetti collaterali direttamente a quello
Federal Institute for Drugs and Medical Pro
prodotti

Dip. Farmacovigilanza

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Sito Web: www.bfarm.de

Mostrare.

Segnalando gli effetti collaterali, è possibile aiutare a fornire ulteriori informazioni su la sicurezza di questo medicinale essere messo.

Come conservare Maprotilin-neuraxpharm

Conserva questo medicinale per i bambini inaccessibile!

Puoi prendere la medicina dopo il

Cartone e i blister dopo "

data di scadenza fino a: "data di scadenza dichiarata no

usare di più. La data di scadenza si riferisce

l'ultimo giorno del mese specificato.

Condizioni di archiviazione

Non conservare a temperatura superiore ai 25 ° C!

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Maprotilin-neuraxpharm 25 mg

Il principio attivo è la maprotilina cloridrato.

1 compressa rivestita con film contiene 25 mg di maprotilina cloridrato.

Gli altri componenti sono: lattosio monohy

drat, amido di mais, calcio idrogeno fosfato diidrato

drat, polvere di cellulosa, silicio altamente disperso di

ossido, magnesio stearato (Ph. Eur.), ipromellosa,

Saccarina sodica, povidone (K 25), talco, titanio

biossido (E 171), ferro (III) ossido (E 172), ferro (III) -idrato

Ossido di ossido x H . O (E 172), ossidi di ferro e idrossidi

(E 172)

Descrizione dell'aspetto di Maprotilin-neuraxpharm 25 mg

e contenuto della confezione

Compresse rivestite con film di colore marrone chiaro, rotonde con un solo lato

Punto.

Maprotilin-neuraxpharm 25 mg è in confezioni

disponibile con 20, 50 e 100 compresse rivestite con film.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert-Strasse 23 • 40764 Langenfeld

Tel. 02173/1060 - 0 • Fax 02173/1060 - 333

Questo foglio è stato modificato l'ultima volta

lavora a dicembre 2015.

Nota per la divisione della compressa rivestita con film:

La compressa rivestita con film Maprotilin-neuraxpharm 25 mg lascia

dividere esattamente quando si rompe il tablet con il

Posizionare la tacca su una superficie dura. Il

La divisione è fatta dalla pressione del pollice.

Gentile paziente,

Maprotilin-neuraxpharm 25 mg compresse rivestite con film sono molto

imballato in un film robusto. Ciò rende difficile l'espressione dal blister. Al

Per poter rimuovere più facilmente le compresse, graffiare con attenzione la pellicola etichettata un oggetto appuntito (chiodo per il pollice, coltellino, ecc.).

Altre forme di dosaggio:

Maprotilin-neuraxpharm 50 mg compresse divisibili rivestite con film

Maprotilin-neuraxpharm 75 mg, compresse divisibili rivestite con film

038,11

1502

40102656

16746