



## MiraLAX -Bottiglie

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

<b>Informazioni sulla</b>	
<b>droga</b>	<b>Scopo</b>
<b>Ingredienti attivo (in ciascuna dose)</b>	
Glicole polietilenico 3350, 17 g (tappo riempito fino alla linea).....	Uso lassativo osmotico •
allevia la stitichezza occasionale (irregolarità) • generalmente produce un movimento intestinale in 1-3 giorni	
<b>Avvertenze</b>	
<b>Avviso di allergia:</b> non utilizzare in caso di allergia al glicole polietilenico	
Non utilizzare in caso di malattie renali se non sotto il consiglio e la supervisione di un medico	
<b>Chiedi a un medico prima dell'uso se lo hai</b>	
• nausea, vomito o dolore addominale • un improvviso cambiamento nelle abitudini intestinali che dura più di 2 settimane • sindrome dell'intestino irritabile	
<b>Chiedi a un medico o a un farmacista prima dell'uso se stai assumendo farmaci o prescrizione medica</b>	
<b>Quando usare questo prodotto</b> potrebbe avere feci molli e più frequenti	
<b>Smetti di usare e chiedi a un medico se</b>	
• ha sanguinamento rettale o la nausea, il gonfiore, i crampi o il dolore addominale peggiorano. Questi possono essere segni di una condizione grave. • ti viene la diarrea. • devi usare un lassativo per più di una settimana	
<b>In caso di gravidanza o allattamento</b> chiedere a un operatore sanitario prima dell'uso. <b>Tenere fuori dalla portata dei bambini</b> in caso di sovradosaggio, richiedere assistenza medica e contattare immediatamente un centro antiveleni.	
<b>Indicazioni •</b>	
<b>non prendere più di quanto indicato a meno che non sia consigliato dal medico</b>	
• la parte superiore della bottiglia è un tappo dosatore contrassegnato per contenere 17 grammi di polvere quando riempito fino alla tacca linea indicata (sezione bianca del tappo) • adulti e bambini di età pari o superiore a 17 anni: • riempire fino alla parte superiore della sezione bianca nel tappo contrassegnato per indicare la dose corretta (17g) • mescolare e sciogliere in qualsiasi 4-8 onci di bevanda (fredda, calda o a temperatura ambiente), quindi bere • utilizzare una volta al giorno • utilizzare non più di giorni • bambini di età pari o inferiore a 6 anni: chiedere al medico	
<b>Altre informazioni •</b>	
conservare a 20°-25°C (68°-77°F) prova di integrità: non utilizzare se il sigillo in alluminio sotto il cappuccio, stampato con "SEALED for YOUR" "PROTEZIONE" manca, è aperta o rotta	
<b>Ingredienti inattivi</b>	
nessuno	
<b>Domande o commenti?</b>	
1-800 MiraLAX (1-888-647-2529)	