

Myocholine-Glenwood®

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

OOMed

Che cos'è Myocholine-Glenwood e quando si usa?

Myocholine-Glenwood è prescritto dal medico. È un medicamento che attiva la muscolatura liscia, specialmente a livello della vescica urinaria e del tratto gastro-intestinale, e può così eliminare una ritenzione urinaria o un bruciore di stomaco cronico (reflusso esofageo).

Quando non si può usare Myocholine-Glenwood?

Non si può usare Myocholine-Glenwood

- in caso di asma o di minaccia d'accesso d'asma,
- in caso di occlusione delle vie urinarie o del tratto gastro-intestinale,
- in presenza di malattie del cuore e dei vasi sanguigni cardiaci, come pure di ipotensione (diminuzione della pressione arteriosa) grave o di bradicardia (polso inferiore a 60 battiti al minuto),
- in caso di epilessia o di malattia di Parkinson,
- in caso di iperfunzione della tiroide.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Myocholine-Glenwood?

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Se a causa di un'ipertonica lo sfintere della vescica non si apre, può verificarsi un ritorno dell'urina nel bacinetto renale. La presenza di batteri nell'urina può favorire un'infezione renale di riflusso.

Poiché non sono ancora disponibili dati sufficienti nei bambini, l'assunzione di Myocholine-Glenwood da parte dei bambini è sconsigliata.

Se contemporaneamente si prende un altro medicamento che stimola i muscoli, l'effetto può essere aumentato in maniera inauspicata e possono verificarsi effetti negativi sulla tolleranza.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Myocholine-Glenwood durante la gravidanza o l'allattamento?

Myocholine-Glenwood non deve essere assunto durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Myocholine-Glenwood?

Myocholine-Glenwood va assunto di preferenza prima dei pasti per impedire l'insorgenza di nausea.

La posologia abituale è di 20–50 mg fino a 4 volte al giorno (da 8 a 20 compresse da 10 mg o da 4 a 8 compresse da 25 mg). Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Myocholine-Glenwood?

In seguito all'assunzione di Myocholine-Glenwood possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: eruttazioni, offuscamento della vista, diarrea, aumento del bisogno di urinare. Inoltre, soprattutto a posologia elevata, si osservano: sensazione di vertigini, mal di testa, nausea e vomito, bradicardia (polso inferiore a 60 battiti al minuto), arrossamento del viso, disturbi gastro-intestinali nonché aumento della lacrimazione e della salivazione e accessi di sudorazione. La peristalsi del tratto gastro-intestinale è nettamente aumentata. Specialmente all'inizio della terapia, improvvisi cambiamenti della posizione del corpo come il passaggio dalla posizione supina (distesa) alla ortostatica (in piedi) possono provocare accessi di vertigini (ipotensione ortostatica).

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, deve informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sull'imballaggio.

Conservare le compresse Myocholine-Glenwood fuori della portata dei bambini, al riparo dall'umidità e a temperatura ambiente (15-25 °C).

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Myocholine-Glenwood?

Una compressa seccabile Myocholine-Glenwood contiene:

Principio attivo: 10 mg risp. 25 mg di betanecolo cloruro.

Sostanze ausiliarie: Excip. pro compr.

Numero dell'omologazione

40087 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Myocholine-Glenwood? Quali confezioni sono disponibili?

Myocholine-Glenwood è in vendita in farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Comprese da 10 mg: 50.

Comprese da 25 mg: 50.

Titolare dell'omologazione

Vifor SA, Villars-sur-Glâne.

Fabbricante

GLENWOOD GmbH, D-82302 Starnberg.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Publicato il 25.06.2013