

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

Capsule di nortriptilinacloridrato, USP

Farmaci antidepressivi, depressione e altre malattie mentali gravi pensieri e azioni suicide

Leggi la Guida ai farmaci fornita con te con il medicinale antidepressivo del tuo familiare.

Parla con il tuo operatore sanitario o con quello di un tuo familiare riguardo a:

- tutti i rischi e i benefici del trattamento con antidepressivi medicinali
- tutte le scelte terapeutiche per la depressione o altre forme gravi di malattia mentale

Qual è l'informazione più importante che dovrei sapere sui farmaci antidepressivi, sulla depressione e su altre malattie mentali gravi sui pensieri o azioni suicide?

1. I farmaci antidepressivi possono aumentare pensieri o azioni suicide in alcuni bambini, adolescenti e giovani adulti entro i primi mesi di trattamento.

2. La depressione e altre malattie mentali gravi sono le cause più importanti di pensieri e azioni suicide.

Alcune persone potrebbero avere un rischio particolarmente elevato di avere pensieri e azioni suicide. Questi includono persone che hanno (o hanno una storia familiare di) malattia bipolare (chiamata anche malattia maniaco-depressiva) o pensieri o azioni suicide.

3. Come posso vigilare e cercare di prevenire pensieri e azioni suicide in me stesso o in un membro della famiglia?

- Prestare molta attenzione a eventuali cambiamenti, soprattutto improvvisi, di umore, comportamento, pensieri o sentimenti. Questo è molto importante quando si inizia a prendere un medicinale antidepressivo o quando si modifica la dose.
- Chiamare immediatamente l'operatore sanitario per segnalare cambiamenti nuovi o improvvisi di umore, comportamento, pensieri o sentimenti.
- Mantenere tutte le visite di follow-up con l'operatore sanitario come programmato. Chiama l'operatore sanitario tra una visita e l'altra, se necessario, soprattutto se hai dubbi sui sintomi.

Chiama immediatamente un operatore sanitario se tu o il tuo familiare avete uno dei seguenti sintomi, soprattutto se sono nuovi, peggiorati o ti preoccupano:

- pensieri sul suicidio o sulla morte
- tentativi di suicidio
- depressione nuova o peggiore
- ansia nuova o peggiore
- sentirsi molto agitato o irrequieto
- attacchi di panico
- difficoltà ad addormentarsi (insonnia)
- nuova o peggiorata irritabilità
- agire in modo aggressivo, arrabbiato o violento
- agire in base a impulsi pericolosi
- un aumento estremo dell'attività del parlare (mania)
- altri cambiamenti insoliti nel comportamento o nell'umore

Problema cardiaco (sindrome di Brugada)

- Se hai svenimenti inspiegabili o hai una storia familiare di morte improvvisa e inspiegabile prima dei 45 anni di età, potresti avere la sindrome di Brugada e non saperlo.
- Parlate immediatamente con il vostro medico se svenite o avvertite battiti cardiaci anomali.

Problemi visivi

dolore agli

occhi • alterazioni della

vista • gonfiore arrossamento all'interno o attorno

all'occhio Solo alcune persone sono a rischio di questi problemi. Potresti voler sottoporerti a una visita oculistica per vedere se sei a rischio e ricevere un trattamento preventivo se lo sei.

Chi non dovrebbe assumere Nortriptilinacloridrato?

Non prendano nortriptilina cloridrato se:

- assumono un inibitore della monoamino ossidasi (MAO). Chiedi al tuo medico o al farmacista se non sei sicuro di assumere un MAO, incluso l'antibiotico linezolid.
 - o Non assumere un MAO entro 2 settimane dall'interruzione della nortriptilina cloridrato a meno che non sia indicato dal medico.
 - o Non iniziare nortriptilina cloridrato se hai interrotto l'assunzione di un MAO nelle ultime 2 settimane, a meno che non sia stato indicato dal tuo medico.

Cos'altro devo sapere sui medicinali antidepressivi?

- **Non interrompere mai l'assunzione di un farmaco antidepressivo senza prima parlare con un operatore sanitario.** L'interruzione improvvisa di un medicinale antidepressivo può causare altri sintomi.
- **Gli antidepressivi sono medicinali usati per trattare la depressione e altre malattie.** È importante discutere tutti i rischi del trattamento della depressione e anche i rischi di ricattarla. I pazienti e le loro famiglie e altri operatori sanitari dovrebbero discutere con l'operatore sanitario tutte le scelte terapeutiche, non solo l'uso di antidepressivi.
- **I farmaci antidepressivi hanno altri effetti collaterali.** Parla con l'operatore sanitario degli effetti collaterali del medicinale prescritto te o al tuo familiare.
- **I farmaci antidepressivi possono interagire con altri farmaci.** Conosci tutti i medicinali che tu o il tuo familiare prendete. Conservare un elenco di tutti i medicinali da mostrare all'operatore sanitario. Non iniziare nuovi farmaci senza prima consultare il tuo medico.
- **Non tutti i farmaci antidepressivi prescritti ai bambini sono approvati dalla FDA per l'uso nei bambini.** Parla con l'operatore sanitario tuo figlio per ulteriori informazioni.

Chiamate il vostro medico per un consiglio medico circa gli effetti collaterali. È possibile segnalare gli effetti collaterali alla FDA al numero 1-800-FDA-1088.

Questa guida ai farmaci è stata approvata dalla Food and Drug Administration statunitense.

Mfd. da: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

Baia di Haifa, Israele 624761

Dist. da: **Taro Pharmaceuticals USA Inc.**

Hawthorne, New York 10532

Revisionato: giugno 2019

MG70997-0619-8