

**Ospen®**

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

**OOMed****Che cos'è Ospen e quando si usa?**

Ospen è un antibiotico (penicillina) che viene somministrato per combattere le malattie infettive di origine batterica. Agisce contro una serie di batteri distruggendo la parete della cellula batterica.

Ospen è una penicillina speciale che può essere ingerita e che viene assorbita solo una volta giunta nel duodeno.

Ospen deve essere utilizzato esclusivamente su prescrizione medica per il trattamento delle infezioni:

- della zona orecchie/naso/gola (angina, faringite, sinusite e otite media)
- delle vie respiratorie (bronchite)
- della pelle
- della scarlattina e febbre reumatica.

Può essere inoltre prescritto a titolo profilattico per prevenire le infezioni e i loro sintomi oppure come complemento di un trattamento in corso a base di iniezioni di penicillina.

**Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Questo farmaco le è stato prescritto dal suo medico per il trattamento della malattia di cui soffre attualmente.

L'antibiotico contenuto nell'Ospen non è efficace contro tutti i microrganismi che provocano le malattie infettive summenzionate. L'assunzione dell'antibiotico sbagliato o non dosato in modo corretto può causare complicazioni. Quindi non lo utilizzi mai di sua iniziativa per il trattamento di altre malattie e non lo consegni ad altre persone.

**Quando non si può assumere Ospen?**

Non assumere Ospen in caso di allergie alle penicilline o ad altri antibiotici (come le cefalosporine).

**Quando è richiesta prudenza nell'uso di Ospen?**

Informi il medico se sa di essere allergico/a ad altri antibiotici. L'assunzione dell'Ospen richiede prudenza di altre affezioni di origine allergica, ad esempio l'asma, di gravi affezioni del tratto gastrointestinale o dei reni.

Un trattamento concomitante con altri antibiotici può avvenire soltanto su prescrizione esplicita del medico. L'effetto del farmaco può diminuire o aumentare in combinazione con antibiotici o preparati chemioterapici ad effetto batteriostatico. L'assunzione della penicillina può essere ridotta dopo pre-trattamento a base di antibiotici aminoglicosidi.

I medicinali antiflogistici e antipiretici (ad esempio l'Aspirina, l'indometacina) come pure i farmaci antigottosi (probenecid) prolungano l'effetto dell'antibiotico, poiché esso viene espulso più lentamente.

Durante il trattamento con Ospen, non è più garantito l'effetto anticoncezionale della «pillola» (contraccettivo orale). Si raccomanda pertanto di adottare precauzioni contraccettive supplementari.

L'assunzione dell'Ospen non dovrebbe avvenire al momento dei pasti.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

**Si può usare Ospen durante la gravidanza o l'allattamento?**

Se è incinta, sta pianificando una gravidanza o sta allattando, può assumere Ospen solo previa consultazione del suo medico o del suo farmacista. Sarà il suo medico o il suo farmacista a decidere se prescriverle Ospen durante la gravidanza o l'allattamento.

**Come usare Ospen?**

Assuma l'Ospen rispettando esattamente le indicazioni del medico. Non modifichi di sua iniziativa né la dose quotidiana, né la durata del trattamento.

In generale, valgono i seguenti dosaggi:

**Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni:** in media 1 compressa pellicolata di Ospen 1000 oppure 1 misurino di Ospen 750 3-4 volte al giorno.

Se necessario: 1 compressa pellicolata di Ospen 1500 3-4 volte al giorno.

**Bambini fino a 2 anni:** ¼ - ½ misurino di Ospen 400 3-4 volte al giorno.

**Bambini da 2 a 6 anni:** ½ - 1 misurino di Ospen 400 3-4 volte al giorno.

**Bambini dai 6 anni:** 1 misurino di Ospen 400 3-4 volte al giorno oppure 1 misurino di Ospen 750 3 volte al giorno.

L'assunzione di Ospen deve avvenire a stomaco vuoto, possibilmente 1 ora ma al più tardi ½ ora prima di un pasto. Le compresse pellicolate si deglutiscono senza masticarli con abbondante acqua.

In alcuni casi, il medico può prescrivere dei dosaggi diversi.

Alcune infezioni richiedono un trattamento di almeno 10 giorni, per poter in parte prevenire lesioni tradive gravi.

Quindi il trattamento non dovrebbe essere interrotto senza il consenso del medico, bensì deve essere continuato anche una volta scomparsi i sintomi.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

**Quali effetti collaterali può avere Ospen?**

Occasionalmente possono manifestarsi reazioni allergiche quali eruzioni cutanee, prurito, congestione nasale, difficoltà respiratorie, dolori alle articolazioni, febbre o calo della pressione arteriosa con collasso circolatorio. In questi casi occorre interrompere l'assunzione del farmaco e avvertire immediatamente il medico.

In alcuni casi sono stati osservati effetti collaterali quali stomatite, infiammazione della mucosa della lingua, nausea, vomito e diarrea. Se dovesse manifestarsi una diarrea molto liquida, eventualmente accompagnata da febbre e dolori addominali, deve sospendere l'assunzione del farmaco e informare il suo medico. In questi casi, si raccomanda di non prendere farmaci contro la diarrea.

Di rado possono manifestarsi secchezza della bocca e alterazione del gusto.

Molto raramente è stata osservata una diminuzione del numero dei globuli rossi o bianchi, rispettivamente delle piastrine.

Un trattamento prolungato con l'Ospen può portare a una colonizzazione micotica delle mucose. In questi casi, occorre chiedere consiglio al medico.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

**Di che altro occorre tener conto?**

I farmaci devono essere conservati fuori della portata dei bambini.

Le compresse pellicolate di Ospen devono essere conservate nella confezione originale, al riparo dall'umidità e non al disopra di 25 °C.

Lo sciroppo di Ospen deve essere conservato in frigorifero (2-8 °C) e al riparo dalla luce.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Exp.» sulla confezione.

Una volta terminato il trattamento, riconsegna al medico o al farmacista il farmaco rimanente per un'eliminazione adeguata.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

**Cosa contiene Ospen?**

Le compresse pellicolate contengono la sostanza attiva penicillina V potassica, lo sciroppo penicillina V benzatina tetraidrato.

*Ospen 1500: compresse pellicolate* da 1.5 mio U.I.

*Ospen 1000: compresse pellicolate* da 1 mio U.I.

*Ospen 750: sciroppo* da 750 000 U.I./5 ml (= 1 misurino).

*Ospen 400: sciroppo* da 400 000 U.I./5 ml (= 1 misurino).

Le compresse pellicolate contengono inoltre i seguenti eccipienti: aromi, saccarina.

Lo sciroppo contiene inoltre i seguenti eccipienti: conservanti: propilparabene (E216), metilparabene (E218); aromi: etilvanillina, vanillina, saccarina. *Ospen 750* contiene anche ciclamato.

**Numero dell'omologazione**

37057 (sciroppo), 37523 (compresse pellicolate) (Swissmedic).

**Dov'è ottenibile Ospen? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

*Ospen 1500 compresse pellicolate*: 12 e 24.

*Ospen 1000 compresse pellicolate*: 12 e 24.

*Ospen 750 sciroppo*: 60 ml e 120 ml (misurino = 5 ml).

*Ospen 400 sciroppo*: 60 ml e 120 ml (misurino = 5 ml).

**Titolare dell'omologazione**

Sandoz Pharmaceuticals S.A., Risch; domicilio: Rotkreuz.

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2007 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

*Publicato il 23.01.2015*