

## Pigmanorm Crema Widmer

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

**OOMed**

### **Che cos'è la crema Pigmanorm e quando si usa?**

La crema Pigmanorm è una crema per schiarire, destinata alla terapia di macchie brune della pelle. La crema Pigmanorm si può usare soltanto su prescrizione medica.

### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Durante la terapia le zone di pelle trattate non devono essere esposte a un'irradiazione UV intensa (sole, soggiorno in alta montagna, lettini abbronzanti). Se questo è inevitabile bisogna utilizzare un prodotto di protezione solare non profumato col fattore di protezione più alto possibile.

### **Quando non si può usare la crema Pigmanorm?**

La crema Pigmanorm non si può usare in caso di melanoma e sospetto di melanoma, di tubercolosi della pelle, di malattie cutanee di origine virale, di infiammazioni acute della pelle, nonché in caso di ipersensibilità conosciuta a uno dei costituenti del medicamento. Non si può usare la crema Pigmanorm per i bambini sotto i 12 anni ed i pazienti con malattie renali. La crema Pigmanorm non va usata su superfici estese.

### **Quando è richiesta prudenza nell'uso della crema Pigmanorm?**

La crema Pigmanorm è un medicamento molto potente. Non superi la durata della terapia prescritta dal medico. Informi il medico se si manifestano prurito e arrossamento, formazione di vescicole o un forte assottigliamento della pelle e lesioni. Evitare l'applicazione su superfici estese (oltre il 10% della superficie corporea) e su zone di pelle in cui l'assorbimento è maggiore (ferite aperte, pelle lesa, aree cutanee colpite da intertrigine come le pieghe della pelle in corrispondenza di articolazioni che permettono una flessione e gli spazi interdigitali delle mani e dei piedi, confini tra pelle e mucose, contorno degli occhi).

Usi la crema Pigmanorm soltanto per la malattia della pelle di cui soffre attualmente e per la cui cura le è stata prescritta dal medico, ma non per altre malattie cutanee che potrebbero manifestarsi in futuro. Non dia la crema Pigmanorm ad altre persone.

Evitare il contatto con gli occhi e le mucose, come pure l'eccessiva irradiazione solare (compresi sole in alta montagna/lettini abbronzanti) e l'applicazione locale concomitante di prodotti desquamanti di uso comune, quali l'acido salicilico, la resorcina e preparati ad azione analoga.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie oppure
- assuma o applichi esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

### **Si può usare la crema Pigmanorm durante la gravidanza o l'allattamento?**

Durante la gravidanza non si deve usare la crema Pigmanorm. Se è incinta, desidera una gravidanza o allatta il medico le prescriverà la crema soltanto in casi eccezionali o se è assolutamente necessario.

### **Come usare la crema Pigmanorm?**

Adulti e ragazzi a partire da 12 anni: Salvo diversa prescrizione del medico, applichi la crema Pigmanorm 1 volta al giorno in piccola quantità sulle zone di pelle iperpigmentate. L'uso deve limitarsi a tali zone. Evitare l'applicazione su superfici estese (al massimo il 10% della superficie complessiva). La durata della terapia, in media, è di sette settimane. In casi eccezionali il medico potrà prescrivere un trattamento di maggior durata, fino a tre mesi al massimo. Se entro tre mesi al più tardi non è visibile una depigmentazione bisogna cessare la terapia. Sulle parti iperpigmentate usi un prodotto di protezione dalla luce ad alto fattore di protezione.

Non sono state finora esaminate l'applicazione e la sicurezza della crema Pigmanorm in bambini sotto i 12 anni (v. paragrafo «Quando non si può usare la crema Pigmanorm?»).

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

### **Quali effetti collaterali può avere la crema Pigmanorm?**

Con l'uso della crema Pigmanorm possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

possono manifestarsi effetti indesiderati locali quali irritazioni della pelle, bruciore, prurito e secchezza nonché reazioni di ipersensibilità. Dopo un uso prolungato possono verificarsi assottigliamento delle zone di pelle trattate, dilatazioni di piccoli vasi sanguigni superficiali e formazione di strie blu-rossastre. Possono verificarsi reazioni allergiche. Informi il medico se attorno alla zona trattata o in altre parti del corpo compaiono macchie chiare o se si osserva una pigmentazione blu-nerastra della pelle (detta ocronosi). In questi casi si dovrebbe interrompere il trattamento con la crema Pigmanorm.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

### **Di che altro occorre tener conto?**

La crema Pigmanorm non dev'essere utilizzata oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Soltanto per uso esterno.

I medicinali devono essere custoditi fuori della portata dei bambini. Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

### **Che cosa contiene la crema Pigmanorm ?**

1 g di crema Pigmanorm contiene:

*Principi attivi:* 50 mg di idrochinone, 0,3 mg di vitamina A-acido, 0,3 mg di desametasone

*Sostanze ausiliarie:* 10,3 mg di dexpantenolo, 32,3 mg di ottile metossicinamato, 16,2 mg di avobenzone, glicole propilenico, antiossidanti: butil idrossitoluene (E321), butilidrossianisolo (E320), conservanti: propile p-idrossi benzoato (E216), metile p-idrossibenzoato (E218) e altre sostanze ausiliarie.

### **Numero dell'omologazione**

46769 (Swissmedic).

### **Dov'è ottenibile la crema Pigmanorm ? Quali confezionisono disponibili?**

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Tubetti da 30 ml.

### **Titolare dell'omologazione**

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren-Zurigo.

### **Fabbricante**

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren-Zurigo.

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2010 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

Publicato il 28.06.2013