

## PROPYLTHIOURACILE®

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

COMPOSIZIONE: Propylthiouracilum 50 mg - Magnes. stearato - Erythrosinum E127 - Cellulos. microcristallin. -Acid. silicicum colloidal. - Amyl. natrii glycollas pro compr. uno. Confezione da 60 compresse di 50mg.

GRUPPO TERAPEUTICO: tireostatico.

INDICAZIONI: Disturbi da iperfunzione tiroidea (ipertiroidismo);

1. Malattia di Graves-Basedow
2. Preparazione all'intervento chirurgico alla tiroide o al trattamento con lo iodio radioattivo.
3. In associazione al trattamento con lo iodio radioattivo.
4. Ricaduta di ipertiroidismo dopo la tiroidectomia.

Per altri disturbi da iperfunzione tiroidea seguire le indicazioni del Medico. QUANDO SI DEVE EVITARE DI USARE IL MEDICINALE

- allergia al **Propylthiouracile**
- Allergie importanti nei confronti di altri tireostatici.
- Importante diminuzione del numero di globuli bianchi.

In caso di gravidanza o allattamento seguire le indicazioni del Medico.

SI RICHIEDE UNA PARTICOLARE PRUDENZA Al comparire dei segni di un forte calo di globuli bianchi, contattare subito il Medico. Questi segni sono: febbre, mal di gola, prostrazione. Consultare il Medico in caso di una forte reazione allergica.

INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI O ALIMENTI.

- L'efficacia di **Propylthiouracile** viene esaltata da altri farmaci contro l'ipertiroidismo, da certi medicinali antidiabetici o antiepilettici, iodio e derivati, PAS (ndt. acido para-amino-salicilico).
- L'efficacia di Propylthiouracile diminuisce se prima di usarlo il Paziente è stato trattato con i farmaci contenenti lo iodio. Prima di assumere assieme al **Propylthiouracile** altre medicine, chiedere il consiglio al Medico.

USO IN GRAVIDANZA O DURANTE L'ALLATTAMENTO Se la Paziente è gravida o diventa gravida durante il trattamento, deve avvertire il Medico curante e seguire le sue indicazioni. Siccome **Propylthiouracile** passa nel latte, l'allattamento al seno durante il trattamento deve essere sospeso. COME USARE E QUALE DOSAGGIO IMPIEGARE? Seguire le indicazioni del Medico. **Adulti:** in genere 100 mg (2 compresse) ogni 8 ore per un periodo da 2 a 6 settimane. Questo dosaggio deve essere gradualmente ridotto fino al dosaggio di mantenimento di 25 fino a 50 mg (1/2 fino a 1 compressa) ogni 8 ore. Se viene continuato il dosaggio di mantenimento di 100 mg (2 compresse) ogni 8 ore, il trattamento deve essere accompagnato dalla somministrazione di levotiroxina.

**Bambini:** Bambini da 3 anni: In genere, come gli adulti, 100 mg (2 compresse) ogni 8 ore per un periodo da 2 a 6 settimane. Questo dosaggio deve essere gradualmente ridotto fino al dosaggio di mantenimento di 25 mg (1/2 compressa) ogni 8 ore.

Bambini con meno di 3 anni

In genere 5 fino a 7 mg pro Kg di peso corporeo in tre somministrazioni giornaliere.

VIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE: per via orale.

COSA FARE QUANDO VIENE ASSUNTA DOSE ECCESSIVA.

Sintomi di overdose:

- Insorgenza o aumento di nausea, vomito e mal di stomaco.
- Manifestazioni di una carenza di funzione tiroidea: aumentata sensibilità al freddo, secchezza della cute, alopecia e a volte la formazione di gozzo.

Chiedere il Medico curante, se il trattamento può essere proseguito a dosaggi diminuiti o se deve essere sospeso. Può essere utile impiegare una terapia farmacologica per sopprimere la sintomatologia gastrica. Se si tratta di avvelenamento importante, potrà essere necessario un ricovero ospedaliero

#### EFFETTI COLLATERALI

- Disturbi digestivi: nausea, vomito, dolori di stomaco.
- Reazioni allergiche: eritema o eruzione cutanea, cefalea, febbre.
- Diminuzione del senso del gusto.
- Dolori articolari.
- Segni di una importante diminuzione di globuli bianchi: febbre, mal di gola, prostrazione.
- quando vengono impiegate dosi eccessive di **Propylthiouracile**: aumentata sensibilità al freddo, secchezza della cute, alopecia e a volte la formazione di gozzo.

Conservazione: Non superare i 25°C e proteggere dall'umidità. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Ultima revisione del foglietto: novembre 2003. TITOLARE AIC: NYCOMED BELGIO Chaussee de Gand 615 Gentssesteenweg - Bruxelles - 1080 - Brussel. Produttore: NYCOMED CHRISTIAENS - Bruxelles