



# Tardocillin® 1200, sospensione iniettabile 1,2 milioni di ore benzatina benzilpenicilline

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

**La Tardocillina 1200 è disponibile nei Paesi Bassi su base standard  
Articolo 3.17 RGW (levering artsverklaring) tramite ACE  
Pharmaceuticals BV / ACE Apotheek (T 036-5227201).  
Questa lettera è una lettera vertalingn de goedgekeurde  
Bijsluiter tedesco.**

**Leggi per gebruik de hele bijsluiter vandie Geneesmiddel goed door,  
Desidero avere informazioni pertinenti.**

- Attenzione a questo bijsluiter. Misschien vuole rivederti più tardi.
- Quando se ancora li, puo anche usare learti dei farmacisti.
- Questo gene è una priorità per persone. Cavolonon c'è nessuna porta  
aan derden. Pealtre persone, questa puo essere una buona idea, anche se  
ze dezelfde klachten hebben as u.
- Quando notici sono molte arti dei farmacisti. Ne vale la pena  
voor bijwerkingen il rivetto in questo bijsluiter ha riferito staan. Vai alla categoria 4.

## Che stato ha in questo bijsluiter

1. Cos'è TARDOCILLINA 1200 e qual parola viene utilizzata?
2. Cosa dovresti usare se hai usato TARDOCILLIN 1200?
3. Come hai utilizzato TARDOCILLINA 1200?
4. Welke mogelijke bijwerkingen zijrhe?
5. Come si acquista TARDOCILLINA 1200?
6. Contenuto della confezione e informazioni verdi

## 1. Cos'è TARDOCILLINA 1200 quale parola viene utilizzata?

La TARDOCILLINA è una sostanza che si trova nella spirale e altre sostanze vengono utilizzate contro le infezioni batteriche (antibiotico).

### TARDOCILLINA parola toegepast

per adulti, bambini e ragazzi:

- come trattamento preventivo a lung termine per la porta aandoeningen cronica  
bepaalde bacteriën (streptococchi, bijv. acuut reuma), nel bijzonder om  
Un'esposizione reumatica del duro te voorkomen.

nei volwassenen e nei giorni più giovani anche:

- per il trattamento di varie sifilidi (primaria, secondaria e della fase latente) b  
massima infettività nell'arco di un anno) e variazioni del territorio  
ruggenmergsvloeistof.
- Primad el trattamento della sifilide con un'infezione per un lung periodo in un anno  
(latente, cardiovasculaire e della sifilide tardiva benigna) met uitzondering van syfilis met  
atasting van de zenuwen en niet aler sprake is van ziekelijke alteringen  
van de ruggenmergsvloeistof.

Quando il paziente inizia l'iniezione durante l'allattamento seno, è un middel toegevoegd per  
plaatselijke verdoving (lidocaine cloridrato).

## 2. Cosa dovresti usare per il tuo TARDOCILLIN 1200?

La TARDOCILLINA potrebbe non essere mai stata utilizzata,

- sesiete ipergevoelig (allergici) alle penicilline, bepaalde middelen per  
plaatselijke verdoving (plaatselijke anesthetican het zuuramidetype) soia,  
pinda's of a van de inventie genoemd staarin rubriek 6
- nelladonna consanguineamento ridotto
- nello stornissen nerod el sistemadi gelificazione a pressione dura
- bij acuut falende functie dura
- grande shock

Quando era su terreno del trattamento vroegeer aanwijzingen zijn voor overgevoeligheid voor  
penicillina, ha gelda uitdrukkelijke waarschuwing voor l'uso di TARDOCILLINA.

Non sono necessari altri antibiotici del tipo betalattamico,  
bijv. Cefalosporine, rekening con allergia. Mogelijke Kruis.

### Waarschuwingen e voorzorgsmaatregelen

- Overleg ha incontrato le arti per TARDOCILLINE con le tue parole toegepast,
- sevaghi con allergie, attenzione [bijv. nell'asma bronchiale, hooi-koorts, netelroos  
(ortocaria)] o nel verdenkingan overgevoeligheid voor  
penicilline. In quest caso, può anche manifestare reazioni allergiche  
tegen TARDOCILLIN optreden.
- se avete una grande quantità di muffe, rischio di allergia  
le reazioni sono più elevate.

L'India è il momento del trattamento con TARDOCILLIN grave, acquoso  
diarree optreedt, evenueel in combinatie con koorts of buikpijn, potrebbe essere stato preso in  
overweging. Questo passaggio può essere utile. Raadpleeg direct arts, l'eventuale trattamento  
con TARDOCILLIN può stopzettes en direct con trattamento abile può iniziare. Utilizzato per  
prevenire il movimento intestinale (peristalsismo).

Il passaggio di lunga durata e herhaaldelijke puo essere infezioni mortali con resistenza  
batteri e muffe gastrointestinali.

Esiste un'allergia nota (overgear) alla lidocaina e al riconoscimento

Un'allergia ai rimedi comparabili per plaatselijke verdoving. plaatselijke anestetica a base di  
zuuramiden).

### TARDOCILLIN può essere utilizzato dal contenuto di lidocaina con il nodige voorzichtigheid

- una bepaalde primadella spierzwakte (miastenia gravis)
- iniezioni in un'area ontstoken (geïnfecteerd).
- zwangerschap (zie onder 'Zwangerschap en borstvoeding')
- neiging tot krampaanvallen (bijv. bij epilepsia)
- Riduce la funzionalità difficile
- geleidingsstoornissen van het hart
- happytoediening van bepaalde middelen tegen hartritme stoornissen  
(antiaritmica di classe III, bijv. amiodaron)

Om onbedoelde injectionin a bloedvat te vermijden zal u darts bepaalde voor-  
zorgsmaatregelen nemen (ziede opmerkingen voor gebruik door artsen resp. medicamente  
addestrato personeel aan het one valse bijsluiter).

### Trattamento delle reazioni gravi e acute ipergevoeligheids

Quando si nota una reazione allergica, come all'aperto, in rete, non è necessario il  
contatto diretto con gli arti. In questocaso, dovrebbero essere adottate misure dirette di  
ingegneria genetica per garantire un trattamento rapido (bijv. toediening antihistaminica,  
corticosteroiden, sympathicomimetica en  
possibilmente perline). Se ha gravi reazioni allergiche, optare per un intervento chirurgico  
Il peso del deposito di tardocillina è stato superato.

### Utilizzo di TARDOCILLIN in combinazione con altri geni

Informaer uw arts of pharmacist of u other genesmiddelen inneemt/gebruikt kort geleden  
innam/gebruikte, alsoas het goes om genesmiddelen thezonder instructions verkrijgbaar  
zijn.

### Effetto di altri geni intermedi sulla TARDOCILLINA

La combinazione del trattamento con antibiotici può comportare un aumento dell'attività  
antibatterica.

Gelijktijdige toediening van probenecide soffre dallo specchio sanguigno più elevato di  
benzilpenicillina e di una lunga permanenza nel sangue. Anche questo ne vale la pena  
Trattamento efficace di indometacina, fenilbutazone, acido etil salicilico, altri composti salicilici  
e sulfonpirazone.

### Coinvolto da TARDOCILLIN altre fonti

Lo specchio sanguigno del metotrexato (middel bijv. per il trattamento dei reumatismi e del  
cancro e per il trattamento della psoriasi) puo essere verhoogd de prestazioni del  
metotrexato possono essere aumentate.

### La ierna interagisce tra iniezioni di lidocaina cloridrato denaro, anche per l'uso di TARDOCILLINA

Bij gelijktijdige toediening van vaatvernauwend genesmiddelen (epinefrina o norepinefrina)  
kan de systemic werking van lidocaine stato amplificato.

Bijktijdige toediening van lidocaine en bepaalde middelen tegen hartritme-stoornissen  
(antiaritmica van Klasse III, bijv. amiodaron) èvoorzichtigheid geboden.

Bijktijdige toediening van lidocaine and moederkoornalkaloiden (middelen  
Gli altrisono stati utilizzati anche per il trattamento dell'emicrania  
ergotamina) di epinefrina puo optare per un'pressione sanguigna più forte.

Prestiamo particolare attenzione all'uso di kalmeringsmiddelen, che uniforma  
centrale zenuwstelsel (CZS) ritrova nel lavoro dannoso defurgone  
L'anestesia plaatselijke puo cambiare. Si parla di un'interactie tussen plaatselijke anestetica  
enerzijds kalmeringsmiddelen oterzijds. Il gruppdast-genoemde genera middelen hooggt  
il crampedrempel de CZS.

### Versterking van de working e mogelijke versterking van de bijwerkingen van other genesmiddelen

Bij gelijktijdig used van aprindine en lidocaine kunnen de bijwerkingen sterker. Aprindine ha  
una struttura chimica vanwege che vergelijkbaar è incontrata van plaatselijke anestheticalso  
vergelijkbare bijwerkingen.

Combinazioni di vari middelen ten behoeve van plaatselijke verdoving hebben ede effetto  
amplificato sul sistema cardiovascolare (duro e ruento)  
nello zenuwstelsel centrale.

L'effetto di sommigespierverslapping genesmiddelen (niet-depolariserende spierrelaxantia) è  
causato dalla lidocaine verlengd.

### Molte interazioni

Se trattati con TARDOCILLINA, le cellule somatiche della pelle possono essere rimosse  
Gli altrisono stati utilizzati anche per il trattamento dell'emicrania  
ergotamina) di epinefrina puo optare per un'pressione sanguigna più forte.

### Zwangerschap e borstvoeding

Vraag vóór inname/gebruik van al genesmiddelen uw arts of apotheker om raad.

### Zwangerschap

Le benzilpenicilline e la lidocaina possono oltrepassare la barriera placentare della barriera  
è il sangue della madre edel bambino. The beperkte ervaring met de toepassing tijdens de  
foringschap duidt on a Damagelijke invloed op de onborn vrucht. Toepassing  
TARDOCILLIN tijdens de foringschap è tutto possibile rispetto alle arti dit uitdrukkelijk voorschrijft  
(indicazione rigorosa).

### Borstvoeding

Le benzilpenicilline e la lidocaina sono presenti opgenomen nell' latte materno. TARDOCILLINA  
potrebbe essere stata utilizzata durante il breve periodo di tempo dell'edizione stampata delle  
arti. Non può mai essere uitgesloten che zuigelingen il borstvoeding krijgen ean da  
contatto con la sostanza workzame della benzilpenicillina  
Antilichamen tegen la sostanza aanmaker (sensibilizzazione) ete maken krijgen  
con una prevenzione della normale colonizzazione batterica dell'intestino.

Andiamo al tavolo e veniamo spruzzati di muffa spettrale.

### Coinvolto nel rivaardigheide nelle macchine operatrici dei furgoni

Possono essere utilizzati gli aspetti dei geni coinvolti nella lidocaina cloridrato  
uitzonderlijke non è mai stato uitgesloten chede injectiekort na  
per utilizzare il nome operativo del veicolo. azionando le macchine  
di opere zonder velding vast beïnvloedt.

Le arti possono essere utilizzate anche in modi diversi e possono essere utilizzate per azionare  
le macchine.

### Informazioni utili su altri componenti di TARDOCILLIN

Questo gene è basato sul sodio che è inferiore a 1 mmol  
(23 mg) di sodio per dose. èvz het è vrijwel vrij van sodio.

## 3. Come hai utilizzato TARDOCILLINA 1200?

TARDOCILLIN parolasopra la porta al gemeen een arts toegediend. Raadpleeg uw arts of  
apotheker als u onzeker si è chinato sulla lavorazione del prodotto.

Questo tipo di prescrizione diversa il dosaggio abituale:

Trattamento al lungo termine per aandoening cronica dovuto agli streptococchi

### Volwassenen, junior e bambini con un peso di 27 kg:

L'India non ha un approccio diverso per adulti, giovani e bambini  
vanaf 27 kg come trattamento preventivo contra reumatismo acuto (1 a) 2 flaconi a  
ese e 1 flacone di TARDOCILLIN 1200 che sovraccarica con 1,2 milioni di once  
benzatina benzilpenicilline). Per i nostri adulti più giovani e più anziani, possiamo avere 2  
persone su ciascun lato della stanza.

### I bambini e i giovani pesano meno di 27 kg. Causa di:

Per bambini con un peso leggero di 3,5 kg e 27 kg

Dose singola piccola di ½ flacone di TARDOCILLIN 1200 (contiene 0,6 milioni di  
benzatina benzilpenicilline) per trattamento.

Per il dosaggio della bevanda di bambini e adolescenti imitese non è possibile completare la  
consegna. I bambini hanno un peso inferiore a 3,5 kg  
Come TARDOCILLIN 1200 non è mai stato utilizzato, non essendo stata sovrascritta la  
dose massima di lidocaina cloridrato di 5 mg per kg peso.

Il bambino aveva 4 anni ed è stato trattato con TARDOCILLINA 1200 con l'attuale priorità data  
alla pianta, in quanto il contenuto di lidocaina cloridrato è intermedio.

### Trattamento della sifilide negli adulti e nei bambini

Bij verworven syfilis lues ten llen bij lues latens non muoiono più dan een  
2,4 milioni di dosi benzatin benzil-penicillina (che è overeenkomst met de hoeveelheid  
suspensie con due flaconi per iniezione con TARDOCILLIN 1200) possono essere iniettate  
una volta e in due dosi diverse e iniettate in plaatsen.

Bij syfilis (lues latens) the dong dan één jaar aanwezig is of waarvan onbekends hoe lang hij  
aanwezig is, sono state somministrate tre iniezioni intramuscolari di alci 2,4 milioni di eenheden  
benzathine benzilpenicilline, con tussenpozen van een week.

Per le dosi nel sistema, i bambini dai 12 anni in su non sono completamente preparati.

### Dosaggio nell'insufficienza renale e leve

Non è mai necessario un aggiustamento del dosaggio.

### Wijze van toediening

Inspuiten in spier (iniezione intramuscolare)

TARDOCILLINA non viene maimandata agli altoparlanti esterni nel sangue del  
Ruggenmergkanaal!

Belangrijke opmerkingen voor toediening door artsen resp. addestrato dal punto di vista medico  
Il personale può essere utilizzato allo stesso modo dell'utente.

### Gebruiksduur

Un trattamento preventivo a lungo termine contro ireumatismi acuti lungo termine meerdere jaren.Hoe longde Treatment Precies duurt, Bepaalt deTreatment Arts, afhankelijk van de Clinical Bevindingen.

**Bij gebruik van a large hoeveelheid TARDOCILLIN daanbevolen**
Bij overdose di benzatinabenzilpenicillinahoeven geen speciale maatregelerte genomen, behalve stopzetting van deoediening van hetgenesmiddel.

Belangrijke opmerkingen susintomi del sovradosaggio/verkeerde toediening door artsen resp.personale con formazionemedica vindt aan het e van deze bijsluiter.

**Come hai sprecato, piegati alla punta diTARDOCILLIN per servire**
Il mezzo geneticoha anche una punta mogelijk veloce.

**Quando smetti di usare TARDOCILLINA**
Allo stesso tempo la cura con TARDOCILLINnon siferma mai e si sovrappone adaltre arti. Diversamente, il rischio di cihè la situazione non sono sempre salutari, edè possibile rinunciarvi.

Come puoi vedere, puoi anche utilizzare il prodotto dal generasformarlo nelle arti del farmacista.

## 4.Quali sono le tue attività lavorative?

Al netto di tutti geni possonoessere allevati TARDOCILLIN bijwerkingen,ti eden nonsono mai stati trattati primalegli altri.

Per le frequentie van bijwerkingen denarrelle seguenti categorie:

Zeer vaak:
Piu di 1 patientesu 10
Vaak:
Da 1 a10 per 100 pazienti
Som:
Da 1 a10 su 1.000 pazienti
Zelden:
Da 1 a10 su 10.000 pazienti
Zeerzelden:
meno di 1su 10.000 pazienti
Non confessare:
La frequentia è reperibileal suolodelle aree accessibili mai stato incluso

Aandoeningen van deuchtwegen, de borstholte e il mediastino

- Frequentia nordichiarata:*
Gezwollen strottenhoofd, crampachtige vernauwing vade bronchi in combi-natie met ademnood, allergic longaandoening(eosinofilia polmonare)

Aandoeningen delmaag-darmkanaal

- Som:*
Ontstekingen van het tong-mondslimvlies, misselijkheid, Braken, diarree

Aandoeningen van de huid e l'onderhuidse weefsel

- Vaak:*
Huiduitslag (morbilli- di esantema scarlatiniforme)
- Zeerzelden:*
Serious, deels levensbedreigendehuidreacties met blaarvorming,waarbij meestal also de slijmvliezen zijn aangetastevens-johnsonsyndroom, tossico necrolisi epidermica)
- Frequentia nordichiarata:*
Vermeerdering van bepaalde bloedlichaampjesas tekenvan overgevoeligheid (eosinofilia), sterk jeukende zwellingen vade huid (netelroos, ofwelorticaria), zwellingen van de huid ende slijmvliezen, vooral in hetzicht, nella luna, de keel en hetrottenhoofd (edeem angioneurotico), ontstekingervan de bloedvaten methuid- slijmvliesbloedingen (vasculitideucocitoclastica, henoch-schönleinpurpura), drukpijngevoelige huidknobbeltjes (eritema nodoso)

Una reazione diretta conbambini piccoli della casa (netelroos ofwel orticaria) è giàstato descritto come un test di tremoreacuto. Il trattamento viene quindi interrotto ed è stato interrotto.

Infezioni eparassiti in Germania

- Zelden:*
Tijdens gravi, diarreaacquosa di nade trattamento, chepuò essere accoppiato gaan ha incontrato koorts di buikpijn, come gruppo di seridarmaandoening (colite pseudomembraneustica)(vedi anche rubrica 2sotto 'Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen')
- Frequentia nordichiarata:*
Infezioni da batteriresistenti e muffegastrointestinali

Aandoeningen delsistema immunitario

- Vaak:*
Reazioni eccessive (de frequentie vanveel afzonderlijkeklachten als La valutazione delle reazioni allergiche sbasa sulla risposta prevenibile nauwkeurig nell'ombra)
- Zelden:*
Gravi reazioni di overgevoeligheids (anafylaxie), shockwaaronder confalende bloedcirculatie, twoweetaanval erbewustzijnsstoornissen (levensbedreigend; zie anche rubrica2, sotto 'Waarschuwingen voorzorgsmaatregelen'), sieroziekte (oa met koorts, opgezettegewehrungen en huiduitslag)
- Frequentia nordichiarata:*
Gemelli allergici, Jarisch-Herxheimerreactie(reazione mogelijke nel trattamento della sifilide (meestalda 2 a12 ore alla prima dose), nota porta koorts, rillingen,algemene eplaatselijke sintomi)

Vaataandoeningen

- Frequentia nordichiarata:*
Afsluiting vanbloedvaten (slagaderen)

Algemene aandoeningen eklachten suiplaats di toediening

- Vaak:*
Verharding van deplaats van injectie,koorts
- Frequentia nordichiarata:*
Posizionandosi sul piatto dell'iniezioneè possibileche possa essere utilizzato anche comeiniezione deswissen èuitgevoerd
La portasi trova al centro delplaatselijke verdoving wordt depijn vanhet iniziare l'iniezione.Na afloop van the pijnstillende effectan de pijn mancano ancora pochi giorni.

Leva e galaandoeningen

- Zeerzelden:*
Danni alle cellule della leva, danni al galvloed

Informazioni aggiuntive/informazioni varie
Il mogelijke bijwerkingen bijtrattamento conpenicillina ringen adalto dosaggio, il vaninvloed zijn op het zenuwstelsel, traden bij TARDOCILLINiet op, vanwege deLage bloedspiegel varhet genesmiddel.

Grazie a ciò, il contenuto riportato decomponente pijnstillende della lidocaina cloridrato può essere ottenuto anche dai bijwerkingen della lidocaina.Bene, si può fare un'iniezionedi olio in unaarena. defolgende reazioni optreden, il tutta la preoccupazione di lichaam:

- Zenuwstelsel:* duizeligheid, frenataleggero gevoel in het hoofdjn extreem uitzonderlijke gevallenanche aanvallen varKramp
- Bloedsomloop:*ziekelijk slowzaamde Hartslag e altwerstoringen van la normale routine dura (hartritmestoomissen tthet levensbedreigende kamer-fibrillaren), shocktoestand, ademstilstand, bloeddrukstijging

La (3-sn-fosfatidil)colina (lecitina di soia) può essereutilizzata per trattare le reazioni allergiche.

Belangrijke opmerkingen voor artsen resp. persona con formazione medica submogelijke grave bijwerkingen bij onbedoelde iniezione in bloedvaten vindt e aan het vandeze bijsluiter.

Reporting da bijwerkingen
Quando tene accorgi, non devi rivolgerai noi conle arti del farmacista. Questo denaro viene pagatanchè dai lavoratori edilidi questo paese. Door het reportvan bijwerkingen kunt and a bijdrage levaaan de vergrotingvan de velaigheid van dit genesmiddel.

**5. Come si acquista TARDOCILLINA 1200?**
Attenzione ai geni nell'area bambini.

U like the genesmiddehiet meer gebruiken na de vervaldatum thep het etiketen het doosjeè aangegeven
Achter 'Te gebruiken dead'. La datadi scadenza è soggetta all'ultima data del verbale e delapporto statale.

Non vuoi usarequesto genea menoche tu nonabbia in mente le seguenti cose:
danneggiamento del flacone smaltatoo della chiusura;
Sospensione cheperde.

**Attenzione**
Conservare al fresco (2 a 8°C); non invadere mai.
Per un servizio unantantum.
Butta viail resto.

## 6. Contenuto della confezione informazioni verdi

**Cos'è la TARDOCILLINA?**

- Il principio attivo è laenzatina benzilpenicillina.
1 flacone con4 mldi sospensione iniettabile contenente1,2 milionidi dosi (= 996,3 mg) benzatinabenzilpenicilline.
- I componenti esistenti sono:
Lidocaina cloridrato 1 H2O (35 mg);carmellosa sodica, (3-sn-fosfatidil)colina (lecitina dsoia), sodio citraato 2 H2Opolisorbaato 40, polisorbaato 80, sorbitaan-palmitaat æqua per preparazioni iniettabili.

**La TARDOCILLINA vieneconsegnata in quanto compresoneella confezione**
La sospensioneè bianca con colore.
Confezione originale con 1 flaconedi sospensione iniettabile da 4ml, fornitocon 1,2 milionidi dosi di benzatina benzilpenicillina (=996,3 mg) per flacone.

**Esigenze farmaceutiche e produttore**
INFECTOPHARM Arzneimittel eConsilium GmbH
Via Von Humboldt 1
D-64646 Heppenheim
Tel.: 0049 (0)6252/ 95-7000
Fax: 0049 (0)6252/ 95-8844
Internet: www.infectopharm.com

**L'ultimo è stato realizzato nell'ottobre2013**

**Le seguenti informazioni sono ideali per arti e mestieripersonale medico addestrato.**

**Wijze van toediening**
Iniezione intramuscolare
La sospensioneè stata lasciata aperta per un minuto e mezzprima dell'apertura dellabottiglia, prima chefosse richiesta laconsegna della merce.
Zorg chei trova sul fondo delflacone di aan de wandengeen residue voorkomt.Quando lasciòi residui,non furono mai distrutti e il contenuto potrebbe non essere stato utilizzato.
La sospensionepuò essere stata estrattae iniettatacon iniezioni a lume ampio (diametro0,8 o 0,9 mm n. 2o 1 ≈21 Go 20 G).

L'iniezione deve essere effettuata per viaintramuscolare nelbovenste, vicino aitribunali del bilspieren, in direzione del bekkenkam di seguendo il metodo diVon Hochstetter.
L'iniettore zoveelmogelijk ina Rechtshoekop hethuidoppervlak en injecteerzover mogelijk van de grotere vaten.
Per l'iniezione siè puntato irtutti i settori.
Quando ha parlataspirato era sanguinante e quando ha optaper l'iniezione l'iniezione è stata interrotta.

L'iniezione non può mai essere effettuata nella donnola conun sanguinamento ridotto.
Wissel at herhaaldelijkgebruik steeds vaninjectieplaats.

Injecteer zo slowzaam mogelijk, conpoca pressione.
Voorkom 'uitwrijven' dopo l'iniezione.

Con un trattamentoa lungotermine conpenicillina depot (bijv. neltrattamento deilues), può usare iniezioni diherhaaldelijke inun'area beperkt dello spierweefsel sprake zijn weefselbeschadiging en doorgroeingcon bloedvaten, waardoorcon l'elke folgende injection de kansoneemt dat de geïnjecteerde stuff in the bloedbaanterechtkomt , ofwel doordirecte injection in a bloedvat, ofwel door de pressione varte injectie of zelfs dooret 'uitwrijven' varhet depot.
Durante il trattamento a lungotermine, l'iniezione successiva viene effettuata nello stesso modo incui è stata effettuata l'iniezione precedente.

Sul terrenodel mogelijke bijwerkingen (nicolau-di hoignésyndroom in combinazione con l'effetto della lidocaïne)è urgentemente noodzakelijk ondoor middel van aspiratiepoging met behulp van a legeinjectiespuit vast te luoghi die
Il rivetto intravasale della canula è intonacato.
Quando ha parlato, l'aspiratsangue è stato rimosso quando ha optaper l'iniezione, quindi l'iniezioneè stata interrotta.

TARDOCILLIN **non** è destinataalle iniezioni sottocutanee, endovenose o intralombari.

Prima che l'iniezione sia pronta!

**Sintomi di sovradosaggio/verkeerd gebruik**
Con un'iniezione*endovenosa* diTARDOCILLIN si può optreden per lahoigné-syndroom, cioè caratterizzata da doodsangst, allucinazioni, stoornis-senporsuizen, duizeligheid, paresthesieën (bijv. tintelingen, gevoelloosheid/doofgevoel) otachicardia (versnelde hartslag). Tutti i sintomiscompaiono completamente entro 30 minuti e scompaionanche i sintomi.

*È possibile effettuare un'iniezioneintraarteriosa* diretta nella sindromedi Nicolaus opttalk. Naastde plaatselijke klachtenals gevolg varischemie, zoalspijn, bleekheid, oedeem- en blaarvorming melatere necrotising, puòda sindrome anche unserio verloop hebben nelvorm vanshock e DIS(gedissemineerde intravasale bloedstolling).

Het hoigné-n nicolausyndroompuò essere rafforzato attraversol'het neigeni-middel aanwezig lidocaine cloridrato.

Prima diutilizzare iltrattamento intravascolare con TARDOCILLINA, può l sintomi optreden thehet gevolg zijn validocaïne.
Il centro centrale reagisceon duizeligheid, frenata, luce alla testa, slapperigheid,euforia, onrust, crampi cerebrale dispneateenslotte, disturbi visivi, spiertrekkingen e ademstilstand.

Gli effetti tossici sul cuore sono meno vaak e influenzano tuttigeleidingstoornissen daltri AV dannosi e purkinjevezels.
Cerchiamo di bradicardia e altri prima dell'HarritmestoomisserPossono anche soffrire della perdita delle ance e della luidurezza e mortea causa della fibrillazione della fotocamera.
In casi estremi siverifica uno shock di ademverlamming mogelijk.

Un ciclododelijk non può mai essere uitgesloten.

**Maatregelen in spoedgevallen en antidotum**
Le benzilpenicilline possono essere tollerate mediante modalisi.

Quando ha optaper iltrattamento intravascolare con alte dosi dilidocaina, bradicardia e ipotensione, il paziente è stato trattato in terapia intensiva.
Kramperè stato trattatocoon piccole dosi herhaaldelijktoegeediende di barbiturici funzionanti (incluso tiopental sodico da 25 a 50 mg) e condiazepam da 5a 10 mgv.
È possibile misurare la pressione sanguigna del paziente nella giusta posizione per portarè simpaticomimetic al servizio.

La bradicardiapuò essere trattata con un farmaco parasimpaticolitico (bijv. atropina), eventualmente può essere trattata con un pacemaker nodig zijn.
Lavoro centrale analeptizijn bij a intoxicatie con plaatselijke ansthetica gecontra-indiceerd!

I sintomi di un'intossicazione da lidocaina all'interno della penetrazione interdalla sospensione iniettabile nel flusso sanguigno siverificano nel terreno a livello del plasma a metà waardetijd snel af.