

Uro-Vaxom®

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

OOMed**Che cos'è Uro-Vaxom e quando si usa?**

Su prescrizione medica.

Uro-Vaxom è un medicamento di origine biologica utilizzato come stimolante del sistema immunitario per potenziare le sue difese naturali. Uro-Vaxom può prevenire le infezioni ricorrenti delle vie urinarie, in particolare le cistiti. Esso può inoltre essere utilizzato in associazione agli eventuali trattamenti prescritti per le fasi acute delle infezioni urinarie.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto allo stesso tempo degli antibiotici o dei disinfettanti delle vie urinarie, non dimentichi di assumerli.

Quando non si può usare Uro-Vaxom?

Se è allergico ai lisati batterici liofilizzati di *Escherichia coli* o a uno qualsiasi degli ingredienti di questo medicamento (elencati nella sezione «Cosa contiene Uro-Vaxom?»).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Uro-Vaxom?

Qualora si verificano reazioni cutanee, febbre o gonfiore localizzato (edema), sospenda il trattamento e informi il suo medico in quanto potrebbe trattarsi di reazioni allergiche.

Informi il suo medico se sta assumendo medicinali immunosoppressivi. Questi medicinali sono usati per ridurre le reazioni immunitarie dell'organismo (ad esempio dopo un trapianto di organi) e possono ridurre o bloccare l'effetto del trattamento con Uro-Vaxom.

La somministrazione di Uro-Vaxom a bambini di età pari o inferiore a 4 anni non è raccomandata.

Finora non è noto che l'assunzione di Uro-Vaxom possa compromettere la capacità di guidare veicoli e usare macchinari.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può somministrare/usare Uro-Vaxom durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o sta pianificando una gravidanza, contatti il suo medico.

Gravidanza

È preferibile evitare l'uso di Uro-Vaxom durante la gravidanza (soprattutto durante il primo trimestre).

Allattamento

Uro-Vaxom può essere usato durante l'allattamento solo dopo aver consultato il medico.

Come usare Uro-Vaxom?**Trattamento preventivo e/o di consolidamento**

1 capsula al giorno, da assumere preferibilmente al mattino a digiuno, per 3 mesi consecutivi.

Trattamento di episodi acuti: 1 capsula al giorno, da assumere preferibilmente al mattino a digiuno, fino alla scomparsa dei sintomi, ma almeno per 10 giorni consecutivi.

L'uso e la sicurezza di Uro-Vaxom nei bambini sotto i 4 anni finora non sono stati esaminati. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Uro-Vaxom?

Uro-Vaxom può provocare effetti collaterali:

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

Diarrea, nausea, mal di testa, problemi digestivi, intolleranza gastrica

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

Reazioni allergiche, dolori addominali, eruzione cutanea, prurito, febbre

Molto raro (interessa meno di 1 persona su 10.000)

Gonfiore (edema) della bocca, gonfiore delle caviglie, dei piedi o delle dita, perdita di capelli

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Uro-Vaxom in un luogo asciutto e tenere fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) nella confezione originale.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Uro-Vaxom?

1 capsula di Uro-Vaxom contiene 6 mg di lisati batterici liofilizzati di *Escherichia coli*, glutammato di sodio e un antiossidante: il gallato di propile (E310).

Gli altri ingredienti sono: amido (pregelatinizzato), magnesio stearato, mannitolo; composizione dell'involucro della capsula: gelatina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), biossido di titanio.

Numero dell'omologazione

00598 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Uro-Vaxom? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 30 e 90 capsule.

Titolare dell'omologazione

OM Pharma SA, Rue du Bois du Lan 22, 1217 Meyrin/Svizzera.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2014 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Publicato il 30.09.2015