

BAUSCH + LOMB

(riassunto del foglietto illustrativo a cura della Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

Viscotears® Liquid Gel

carbomer (acidopoliacrilico)

Opuscolo informativo per il paziente

Questo prodotto verrà chiamato Viscotears in questo foglio illustrativo.

Si prega di leggere attentamente questo foglio prima di iniziare a usare Viscotears.

Contiene informazioni importanti. Conserva il foglio illustrativo in un luogo sicuro perché potresti volerlo leggere di nuovo.

Non condividere questi colliri con nessun altro nel caso in cui tu abbia un'infezione agli occhi che potresti trasmettere.

Se hai altre domande o se c'è qualcosa che non capisci, chiedi al tuo farmacista.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o se noti la comparsa di un effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

In questo volantino:

1. Che cos'è Viscotears e a cosa serve
2. Cose da considerare prima di iniziare a utilizzare Viscotears
3. Come usare Viscotears
4. Possibili effetti collaterali
5. Come conservare Viscotears
6. Ulteriori informazioni

1. Che cos'è Viscotears e a cosa serve

Viscotears contiene il principio attivo carbomer (acido poli(acrilico)).

Viscotears viene utilizzato per dare più comfort ai tuoi occhi quando si sentono asciutti.

Fa parte di un gruppo di colliri chiamati "lacrime artificiali".

2. Cose da considerare prima di iniziare a utilizzare Viscotears

NON utilizzare Viscotears se:

- Se è allergico al carbomer o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Faccia particolare

attenzione: nei bambini e negli adolescenti di età fino a 18 anni la sicurezza e l'efficacia di Viscotears alla posologia raccomandata negli adulti è stata stabilita dall'esperienza clinica, ma non sono disponibili dati di studi clinici.

Avvertenze e precauzioni

- Utilizzare solo Viscotears negli occhi. • **Se** hai problemi agli occhi diversi da irritazione, secchezza oculare, si rivolga al medico o al farmacista prima di iniziare a usare Viscotears.
- Se avverte dolore agli occhi, alterazioni della vista, irritazione degli occhi, arrossamento persistente, oppure se la condizione peggiora o persiste, interrompere l'uso e consultare il medico.
- Se stai assumendo altri medicinali. Si prega di leggere anche il paragrafo "Uso di altri medicinali".

Altri medicinali e Viscotears

Informa il medico o il farmacista se stai usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Se stai usando altri medicinali in collirio o unguento per gli occhi, attendi almeno 5 minuti tra ogni medicinale. Viscotears dovrebbe essere sempre l'ultimo collirio utilizzato.

Gravidanza e allattamento Se sei in

corso di una gravidanza o stai allattando, se sospetti di essere in gravidanza, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Viscotears contiene cetrimide

Un conservante presente nel Viscotears (cetrimide) può causare irritazione agli occhi ed è noto anche che scolorisce le lenti a contatto morbide.

Se indossi lenti a contatto, dovresti rimuoverle prima di usare Viscotears e attendere almeno 15 minuti prima di rimetterle.

Guida all'uso di macchinari

Alcune persone potrebbero scoprire che la loro vista è offuscata immediatamente dopo aver usato Viscotears. Se interessato, attendi fino a quando la vista non si chiarisce prima di guidare o utilizzare macchinari.

3. Come usare Viscotears

Se il tuo medico ti ha prescritto Viscotears, ti dirà come e quando usarlo e la dose sarà riportata sull'etichetta del farmacista.

Il dosaggio abituale è:

Adulti (inclusi gli anziani): una goccia in ciascun occhio affetto, tre o quattro volte al giorno.

Bambini e adolescenti età fino a 18 anni:

La sicurezza e l'efficacia di Viscotears nei bambini e negli adolescenti alla posologia raccomandata negli adulti sono state stabilite dall'esperienza clinica, ma non sono disponibili dati provenienti da studi clinici.

Se non è sicuro chieda al medico o al farmacista.

Come usare il collirio

1. Lavati le mani.
2. Se indossi lenti a contatto rimuovile prima di usare le gocce e non sostituirle per almeno 15 minuti.
3. Tenere il tubo **verticalmente** (vedere figura 1).
4. Inclinare la testa all'indietro (vedere figura 2).
5. Appoggia una mano sulla guancia e abbassa delicatamente la palpebra inferiore.
6. Guarda in alto.
7. Inserire una goccia premendo delicatamente il tubo (vedere figura 3).
8. Sbattere le palpebre alcune volte per distribuire uniformemente il gel liquido sull'occhio.
9. Rimuovere il gel in eccesso attorno alle palpebre.
10. Se necessario, ripeti per l'altro occhio.

NOTA: non toccare l'occhio o l'area circostante con la punta del contagocce poiché ciò potrebbe causare lesioni agli occhi e contaminare il gel.

Se usi più Viscotears di quanto dovresti, non è previsto che tu possa soffrire di effetti collaterali, tuttavia, se noti problemi che ritieni siano correlati consulta un medico. Seguire attentamente le istruzioni.

Se c'è qualcosa che non capisci, chieda al tuo farmacista o medico.

Non utilizzare Viscotears Liquid Gel oltre le quattro settimane dalla prima apertura.




Figura 1



figura 2



Figura 3

4. Possibili effetti collaterali

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Potresti avvertire le seguenti reazioni ai tuoi occhi:

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10): visione offuscata

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10): fastidio agli occhi, formazione di croste sulle palpebre, irritazione agli occhi.

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100): gonfiore degli occhi, dolore agli occhi, prurito agli occhi, arrossamento degli occhi, aumento della produzione lacrimale.

Oppure, reazioni in altre parti del corpo:

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100): infiammazione della pelle.

Ulteriori effetti indesiderati segnalati dall'esperienza post-marketing, di cui la frequenza non è nota: Reazioni allergiche (i sintomi possono includere prurito, arrossamento, gonfiore o dolore agli occhi o arrossamento, gonfiore o eruzione cutanea intorno all'occhio).

Segnalazione degli effetti collaterali

Se si manifestano effetti collaterali, si rivolga al medico o al farmacista. Ciò include qualsiasi possibile effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo. Può anche segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (vedere dettagli di seguito). Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Regno Unito

Schema del cartellino giallo

Sito web: www.mhra.gov.uk/whitecard

5. Come conservare Viscotears

Tenere tutti i medicinali fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non conservare le gocce a temperatura superiore a 25°C.

Non utilizzare le gocce per più di 28 giorni dopo la prima apertura del tubo.

Non utilizzare il collirio dopo la data di scadenza riportata sul tubo (SCAD).

Riporta i Viscotears non utilizzati al farmacista affinché li distruggano. Non gettarlo via con la normale acqua o i rifiuti domestici.

Ciò contribuirà a proteggere l'ambiente.

6. Ulteriori informazioni

Viscotears contiene 2,0 mg/g di principio attivo carbomer (acido poliaccrilico). Il gel liquido contiene anche gli ingredienti inattivi cetrimide (come conservante), sorbitolo, idrossido di sodio e acqua. Ogni tubo contiene 10g di Viscotears.

Titolare della licenza del prodotto e produttore responsabile dell'immissione sul mercato è il Dr.

Gerhard Mann chem.-pharm Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173, 13581

Berlino, Germania

Questo foglio illustrativo è stato rivisto nell'ottobre 2016.

P1UK02
42540PB296/2-UK