

Pangrol® 10000

10.000 unità Ph.-Eur di lipasi

Capsule rigide con rivestimento enterico

Principio attivo: polveri di pancreas suino

Legga attentamente questo foglio prima di iniziare a prendere questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.

Prenda sempre questo medicinale esattamente come descritto in questo foglio esattamente come le ha detto il medico o il farmacista.

- Conservare il foglio illustrativo. Potresti volerlo leggere di nuovo.
- Chiedi al tuo farmacista se hai bisogno di ulteriori informazioni o consigli.
- Se noti effetti collaterali, contattate il vostro medico o il farmacista. Ciò vale anche per gli effetti collaterali non elencati in questo foglio illustrativo. Vedere la sezione 4.
- Se non ti senti meglio o addirittura peggio, contatta il tuo medico.

Cosa c'è in questo foglio illustrativo

1. Cos'è Pangrol 10.000 e a cosa serve?
2. Cosa dovresti considerare prima di prendere Pangrol 10.000?
3. Come prendere Pangrol 10.000?
4. Quali effetti collaterali sono possibili?
5. Come conservare Pangrol 10.000?
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Pangrol 10.000 e a cosa serve?

Cos'è Pangrol 10.000?

Pangrol 10.000 è un medicinale che contiene sostanze digestive (enzimi) provenienti dal pancreas dei suini (polvere di pancreas, chiamata anche pancreatina).

A cosa serve Pangrol 10.000?

È usato per trattare l'indigestione causata dalla ridotta o assente funzionalità pancreatiche.

2. Cosa dovresti considerare prima di prendere Pangrol 10.000?

Pangrol 10.000 non deve essere preso

- se è allergico al pancreas in polvere, alla carne di maiale o ad qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6
- se soffre di un'infezione acuta del pancreas o ha un attacco acuto di infiammazione cronica del pancreas durante la fase conclamata della malattia. Tuttavia, nella fase di declino della dieta (dieta leggera), è consigliabile occasionalmente la somministrazione di Pangrol 10.000 se persistono disturbi digestivi.

Avvertenze e Precauzioni

Si prega di parlare con il medico Farmacista, prima di prendere Pangrol 10.000,

- se ha sintomi simili a un'ostruzione intestinale notare difficoltà in se stesso (ad es. Dolore addominale, mancanza di movimento intestinale, nausea, vomito). L'ostruzione intestinale è una complicanza nota nei pazienti con fibrosi cistica. Se riscontrate sintomi gastrointestinali insoliti o cambiamenti nei sintomi, dovrete far riesaminare dal vostro medico come misura precauzionale per escludere la possibilità di danni intestinali. Ciò colpisce soprattutto i pazienti che assumono ogni giorno più di 10.000 unità Ph. Eur. di lipasi per chilogrammi di peso corporeo.

Questo medicinale contiene enzimi attivi che, quando rilasciati nell'attività orale (ad esempio attraverso la masticazione) può causare danni alla mucosa (ad es. ferite nella mucosa orale). Pertanto, assicurati di prendere Pangrol 10.000 intero.

Assunzione di Pangrol 10.000 insieme ad altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe assumere altri medicinali.

L'assorbimento dell'acido folico (assorbimento dell'acido folico nel sangue) può essere ridotto assumendo medicinali pronti contenenti polveri di pancreas, per cui potrebbe essere necessaria un'ulteriore assunzione di acido folico.

L'effetto dei principi attivi ipoglicemizzanti **acarbose** e **glitolo** può essere ridotto assumendo contemporaneamente Pangrol 10.000.

periodo di gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza o sta allattando, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare qualsiasi medicinale.

Non esiste esperienza sufficiente sull'uso di Pangrol 10.000 nelle donne in gravidanza.

Non ci sono dati sufficienti provenienti da studi sugli animali riguardanti la gravidanza, lo sviluppo del feto, il parto e lo sviluppo del bambino dopo la nascita.

Il possibile rischio per l'uomo non è noto. Se sei incinta o stai allattando, non devi assumere Pangrol 10.000 a meno che il tuo medico non lo ritenga assolutamente necessario.

Abilità di guida e Capacità di operare macchinari

Pangrol 10.000 non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare e di usare macchinari.

3. Come prendere Pangrol 10.000?

Prenda sempre questo medicinale esattamente come le ha detto il medico. Consulta il tuo medico o il farmacista se non sei sicuro.

dosaggio

La dose raccomandata è:

2 - 4 capsule Pangrol 10.000 per pasto (equivalenti a 20.000-40.000 Ph.-Eur. unità di lipasi per pasto).

Il dosaggio dipende dalla gravità dell'indigestione, quindi la dose richiesta potrebbe essere più alta. La dose deve essere aumentata solo sotto controllo medico e deve essere mirata a migliorare i sintomi della malattia (ad esempio feci grasse, dolore addominale).

Non deve essere superata una dose giornaliera di enzima compresa tra 15.000 e 20.000 unità di lipasi per chilogrammo di peso corporeo. Soprattutto nei pazienti affetti da fibrosi cistica la dose di enzima deve essere superiore a quella necessaria per un adeguato assorbimento dei grassi.

Il medico dovrebbe decidere il dosaggio per i bambini.

tipo di applicazione

Prendi la medicina **intera**

con abbondante liquido, preferibilmente a metà pasto.

I pazienti che non desiderano ingerire l'intera capsula possono anche posizionarla su un recipiente adatto, come ad es. un bicchiere, aprirlo separandolo e deglutire il contenuto solo con un po' di liquido senza masticare.



Si prega di assicurarsi che le capsule e le mini-compresse che contengono quando si aprono le capsule vengano inghiottite intere, poiché Pangrol 10.000 perde il suo effetto se masticato e gli enzimi in esso contenuti possono danneggiare la mucosa se rilasciati nell'attività orale. Dovresti bere molti liquidi (acqua o succo di frutta).

Durata dell'applicazione

Non vi è alcuna restrizione sulla durata di utilizzo. Dipende dal decorso della malattia ed è determinato dal medico. Se non ti senti meglio o addirittura ti senti peggio, contatta il tuo medico.

Si rivolga al medico o al farmacista se ha l'impressione che l'effetto di Pangrol 10.000 sia troppo forte o troppo debole.

Se prendi più Pangrol 10.000 di quanto dovresti

Bevi molta acqua e parla con il medico o il farmacista. Dosi estremamente elevate di polvere di pancreas possono portare ad un aumento dell'acido urico nel sangue (iperuricemia) e nelle urine (iperuricosuria), in particolare nei pazienti con fibrosi cistica.

Se dimentichi di prendere Pangrol 10.000

Non prenda una dose doppia se ha dimenticato la dose precedente, ma continui il trattamento come raccomandato.

Se smetti di prendere Pangrol 10.000

Se interrompe o interrompe prematuramente il trattamento, deve farlo

aspettati che i suoi sintomi possano ripresentarsi. Si prega di consultare il medico.

Se avete ulteriori domande sull'uso del medicinale, contattate il vostro medico o il farmacista.

4. Quali effetti collaterali sono possibili?

Come tutte le medicine, questa può avere effetti collaterali non tutti coloro che li curati presentano.

Notare che:

Se nota uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati, interrompa l'assunzione di Pangrol 10.000 e contatti immediatamente il medico. Questo deciderà quindi il tipo di ulteriore trattamento.

Effetti indesiderati molto rari (interessano meno di 1 persona su 10.000):

- Diarrea, fastidio addominale, dolore addominale, nausea, vomito
- reazioni allergiche di tipo immediato, ad es. B. Eruzione cutanea, orticaria (orticaria), starnuti, lacrimazione, respiro corto dovuto al restringimento delle vie aeree (broncospasmo), respiro corto
- reazioni allergiche del tratto digestivo
- Nei pazienti affetti da fibrosi cistica, è stato descritto un restringimento della regione dell'intestino tenue/appendice delle sezioni del colon ascendente dopo la somministrazione di dosi elevati di polvere di pancreas. Questi restringimenti possono eventualmente portare a un'ostruzione intestinale (vedere paragrafo 2. "Avvertenze e precauzioni").

Frequenza degli effetti indesiderati non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- Nei pazienti affetti da fibrosi cistica può verificarsi un aumento dell'escrezione di acido urico nelle urine soprattutto quando si assumono dosi elevate di polvere di pancreas. Pertanto in questi pazienti l'escrezione di acido urico nelle urine deve essere monitorata per evitare la formazione di calcoli di acido urico.

Segnalazione degli effetti collaterali

Se notate effetti collaterali, contattate il vostro medico o il farmacista. Ciò vale anche per gli effetti collaterali non elencati in questo foglio illustrativo. È inoltre possibile segnalare gli effetti collaterali direttamente all'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici, Dipartimento di farmacovigilanza, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, sito web: www.bfarm.de. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Pangrol 10.000?

Tenere questo medicinale fuori dalla portata e dalla portata dei bambini. Non è più possibile utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla scatola pieghevole e sull'etichetta dopo il consumo entro". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese specificato.

Tieni il contenitore chiuso ermeticamente.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Periodo di validità dopo l'apertura: 3 mesi

Non smaltire i farmaci nelle acque reflue o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare questo medicinale e non lo usa più. Contribuisca a proteggere il nostro ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Pangrol 10.000

Il principio attivo è la polvere di pancreas suino.

1 capsula rigida gastroresistente (capsula rigida con minicompresse gastroresistenti) contiene 75,6-137,4mg di polvere di pancreas di maiale:

- Attività lipasica 10.000 Ph. Eur. unità/capsula
- Attività dell'amilasi 9.000 Ph. Eur. unità/capsula
- Attività della proteasi 500 Ph. Eur. unità/capsula

Gli altri componenti sono:

Olio di ricino idrogenato, biossido di silicio altamente disperso, magnesio stearato (Ph. Eur.) [vegetale], croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, copolimerico metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% (Ph. Eur.), talco, trietil citrato, emulsione simeticone 30%, ferro (III)ossido (E 172), ferro (III)idrossido xH₂O (E 172), carminio indaco (E 132), giallo di chinolina (E 104), biossido di titanio, gelatina.

Che aspetto ha Pangrol 10.000

Contenuto della confezione

Pangrol 10.000 capsule rigide sono costituite da una testa giallo-verde e un corpo arancione chiaro e contengono

minicompresse di colore marrone chiaro, lucide, omogenee (rivestimento enterico). Le capsule vengono riempite in contenitori di polipropilene, che vengono chiusi con chiusura in polietilene con essiccante. I contenitori sono imballati in una scatola di cartone (scatola pieghevole) insieme alle istruzioni per l'uso.

Pangrol 10.000 è disponibile in confezioni da 20, 50 (N1), 100 (N2) e 200 (2x 100) capsule rigide gastroresistenti (N3).

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Imprenditore e produttore farmaceutico

BERLINO-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125
12489 Berlino
Germania

Questo foglio illustrativo è stato rivisto l'ultima volta nel gennaio 2015

Guarisci presto!

A questo punto qualche informazione in più per i pazienti fedeli islamica: potete prendere anche Pangrol 10.000.

Permetteteci di sottolinearlo. Il versetto 173 della seconda sura Coranodice:

Turco:

Allah size ölü (boğazlanmamıy hayvanın) etini, akan kanı, demini ve Allah'tan baykasy (putlar) için kesilmıy hayvanı haram etmiytir. Fakat helak olacak dercede kadan, istemeyerek ve zaruret miktarını aymayarak kandan yerse, günahı lemiy sayılmaz. yüphesiz ki, Allah çok bayılayıc çok rahmet sahibidir.

Tedesco:

Solo ciò che è proibito è ciò che è morto, il sangue che scorre, maiali e ciò che non è stato macellato (o sacrificato agli idoli) nel nome Allah. Ma chi ne gode (necessità), involontariamente, senza cattiva intenzione e non eccessivamente, facendo non ha commesso alcun peccato; poiché Allah è perdonatore e misericordioso.